

А. Официална частъ.

ДЕЙНОСТЪ НА ДРУЖЕСТВОТО.

Отчетъ за дейността на Бълг. Ентомологично дружество презъ 1931 година.

По-главни моменти отъ живота на Дружеството презъ 1931 година сж:

1. Публикува се книжка VI отъ Известията на Дружеството съ богато и разнообразно съдържание.

2. По случай 70 години отъ рождението на Негово Величество Царъ Фердинандъ I, основател на първия ентомологически институтъ въ страната ни — Царската Ентомологична Станция и много заслужилъ за ентомологичната наука на България, Дружеството Го избра за свой почетенъ членъ и съ специаленъ адресъ Го поздрави и Му поднесе дипломата за почетно членство, както и подвързани всички издания на Дружеството.

По тоя случай Царъ Фердинандъ благодари съ едно трогателно писмо.

3. Почина въ Прага (Чехословакия) видниятъ и много заслужилъ ентомологъ D-r Fr. Rambousek, почетенъ членъ на Дружеството и допринесълъ твърде много за проучване колеоптерната фауна на страната ни, особено семейство Staphylinidae. Д-ръ Ив. Бурешъ въ специално заседание говори за неговото животоописание и неговитѣ заслуги къмъ родната ни Ентомология.

4. Дружеството избра за свой почетенъ членъ видниятъ чехословашки колеоптерологъ Д-ръ Обенбергеръ, Директоръ на Зоологическия отдѣлъ при Народния музей въ Прага, доста заслужилъ съ изучаванията си върху семейство Vuprestidae отъ България и съ услугитѣ, които прави на българскитѣ ентомолози съ литература и опредѣления на материали.

5. Prof. H. Rebel, Директоръ на Виенския музей, почетенъ членъ на Дружеството и виденъ лепидоптерологъ, празнува 70 години отъ рождението си. По тоя случай Дружеството го поздрави. Проф. Rebel отговори съ възторжено писмо.

6. През течение на годината нашият почетен член и член основател Дим. Иоакимов, частен хонорирован доцент по Ентомология публикува своя обемист труд: Ръководство по Ентомология с оглед на вредните насекоми, — издание на Университетската библиотека № 103. Това е единствено за сега по-обемисто ръководство по Ентомология на български. Разгледани са почти всички по-главни неприятели по нашите културни растения, горите и домашните животни.

7. Въ Държавен вестник брой 264 от 26. II. 1931 г. се публикува „Правилник за ентомологичната служба въ България“, според който ентомологичната служба въ страната се води и изпълнява от Ентомологичния отдел при Държавната земледелска опитна и контролна станция въ София. На тази служба се възлагат всички инициативи и мерки по прилагане Закона за опазване на растенията от неприятели, както и изработване на всички правилници и наредби по приложението му.

Според чл. 11 от Правилника, службата влиза въ непосредствена връзка съ всички институти и организации въ страната, за да използва до максимална степен тяхната помощ въ работата си по борбата съ неприятелите на земледелските култури и произведенията, получавани от тях. — Съгласно това постановление на чл. 11 от Правилника, Ентомологичния отдел при Земледелската опитна станция може винаги да потърси съдействието и на Българското Ентомологично дружество, което съ готовност ще се отзове на всяка една покана. — Прочее, пожелаваме на ръководителите на ентомологичната служба въ страната, опрени на тоя Правилник, плодотворна и пълна съ успехи работа въ борбата съ вредните насекоми по културните растения, горите и домашните животни, при която борба по-често да се обръщат за съдействие и към общото на всички Българско Ентомологично Дружество.

Освен това Дружеството е отбелязало още и следната дейност:

1. Срещи и събрания. — През отчетната година Дружеството е продължило своята научно-приложна дейност, която се изразява въ ежеседмичните срещи и събрания, на брой 22, въ които са направени 112 съобщения и реферати по разни въпроси из областта на приложната и теоритична Ентомология. — Както седмичните срещи и събрания, тъй и четените съобщения и реферати са доста по-малко по брой от миналогодишните. Това се дължи на обстоятелството, че по предложение на някои членове, възприе се срещите да стават не ежеседмично, а през седмица.

По-важнитѣ отъ четенитѣ съобщения и реферати сж публикувани въ настоящата книжка VII на Известията на Дружеството въ отдѣла: „Реферати и съобщения.“

II. Членство. — Движението на членоветѣ презъ отчетната 1931 година е:

а) Почетни членове: Въ началото на годината . . .	9
Приети нови почетни членове	2
Всичко . . .	11
Починалъ презъ годината	1
Оставатъ въ края на 1931 година всичко . .	10
б) Дописни членове: непромѣнени	1
в) Действителни членове: Въ началото на год. .	42
Приети нови членове	5
Всичко . .	47

Така че, къмъ края на 1931 година Дружеството брои 10 почетни, 1 дописенъ и 47 действителни членове.

III. К а с а. — Преди да дамъ баланса за състояието на касата презъ 1931 година, дължа да съобща, че предъ видъ тежкото финансово положение на държавата и стопанската криза, Държавата, респективно Министерствата на Земледѣлието и Просвѣтата, които субсидиратъ Дружеството, намалиха чувствително субсидиитѣ, които отпущаха на Дружеството. Така презъ отчетната година Дружеството получи само по 5,000 лева, или всичко 10,000 лева отъ дветѣ Министерства, когато по-рано е получавало по 15—20,000 лева отъ всѣко едно. — Затова налага се на Дружеството да пести своитѣ срѣдства.

Въ съгласие съ това позволявамъ си да препоръчамъ тази година да печатаме малки известия.

Състоянието на касата презъ отчетната година е дадено въ следния балансъ:

БАЛАНСЪ НА КАСАТА НА БЪЛГ. ЕНТОМОЛОГИЧНО Д-СТВО НА 31. XII. 1931 г.

П Р И Х О Д Ъ		лева	ст.	лева	ст.	Р А З Х О Д Ъ		лева	ст.	лева	ст.
1. Наличностъ въ касата . . .		1,085	—			1. Печатъ на кн. VI отъ Извѣ- стията		22,669	—		
2. Наличностъ въ Пражка банка къмъ 30. XI. 1930 г. . .		93,577	—			2. Хонораръ за кн. VI отъ Изв.		8,680	—		
3. Лихви до 31. XII. 1930 г. .		3,955	—			3. Клишета за сжщитѣ		823	—		
4. Лихви до 30. VI. 1931 г. .		3,592	—			4. Хромова хартия		1,155	—		
5. Помощи отъ М-вото на Нар. просвъщение.		5,000	—			5. Корици на списанието . . .		420	—		
6. Помощи отъ М-вото на Зе- мледѣлнето		15,000	—			6. Канцеларски.		760	—	34,507	—
7. Помощи отъ М-вото на Зе- мледѣлнето		5,000	—			За уравнение.				91,124	
8. Членски вносъ		660	—			1. Наличностъ въ банката. . .		—	—	3,238	
9. Отъ реклами		1,000	—			2. Наличностъ въ касата . . .		—	—		
Всичко .		—	—	128,869	—	Всичко .		—	—	128,869	—
Наново на 1. I. 1932 г.											
1. Наличностъ въ касата . . .		3,238	—								
2. Наличностъ въ Пражка банка		91,124	—								

Всички налични суми, съгласно протоколно решение на общото събрание, сж дадени на хранение въ „Англо-Чехословашка и Пражка кредитна банка“, клонъ София, съ 8% бруто лихва. София, 3.XII. 931 г.

Секретаръ: Пенчо Дрънски.

Членове на Дружеството.

Почетни членове:

1. Негово Величество Борисъ III — Царь на Българитѣ.

2. Негово Величество Царь Фердинандъ I. Председателя на Руското Ентомологично Дружество въ Ленинградъ Семеновъ Тянь-Шански Андрея Петровичъ. Василевски островъ, 8 Линия, № 39.

4. Rebel, Prof. Dr H. — Директоръ на Зоологическия отдѣлъ при Виенския музей. Wien 1, Burgring 1. Naturhistorisches Statsmuseum. — Lepidopt.

5. Horvat, Dr Geza — Direktor d. Zoolog. Abteilung d. Ungarischen National-Museums. Budapest. — Haemipt.

6. Кулагинъ, Н. М. — Професоръ по Ентомология въ Москва. Professor a. d. Moskauer Universität. Petrovsko-rasumovskoje. Moskwa.

7. Apfelbeck, Victor. — Direktor Biološki medikoenomološki institut inspektorata Ministerstva Narodnog zdravlja. Sarajewo. — Coleopt.

8. Иоакимовъ, Дим. — Доцентъ по Ентомология въ Агрономическия факултетъ при Университета — София. — Haemipt., Ent. aekonom.

9. Мокржецки, Проф. Зигмундъ А., — Zaklad Ochrany Lasowi Entomologii. Skierniewice — Polsko.

10. † Rambousek Dr Fr. — Фитопатологъ въ института за проучв. захарното цвекло. Viskumny Ustav Cusrovarnicku Praha, Střešovice. — Coleopt., Ent. aekonom.

11. Obenberger, Prof. Jan — Директоръ на Зоологическия отдѣлъ при Народния музей въ Прага (Чехословакия). Narodni Muzeum, Praha. — Coleop.

Дописни членове:

12. Junk, Dr Wilhelm. — Verlag und Buchhandlung. Berlin W. 15, Sächsische Strasse 68.

Действителни членове:

1. Аджаровъ, Д-ръ М. — Лѣкаръ, Лѣджене, Чепинско. Lepid., Collembola.

2. Атанасовъ Н. — асистентъ при Царската Зоологическа градина, София.

3. Бахметиевъ Коста — Гара Костенецъ-Баня. — *Lepidoptrea*.

4. Бурешъ, Д-ръ Ив. — Директоръ на Научнитъ Институту на Н. В. Царя, София — Двореца. *Lepidoptera*, *Fauna cavernicola*, *Vertebrata*.

5. Бошковъ, Ст. — Пловдивъ, ул. Дизонъ № 5. *Lepid.*

6. Вукасовичъ, Д-ръ П. — Асистентъ въ Бѣлградъ. *Zentralni Higijenski Zavod*; *Sumadijska ulica*. — *Hymenopt. paras.*

7. Георгиевъ Ив. — Асистентъ по лозарство при Агрономо-Лесовѣдния факултетъ, Университета, София. *Ent. aek.*

8. Градоевичъ, Михайло. — Доцентъ по Ентомология въ Бѣлградския Университетъ. Студеничка ул. № 55, Београда. — *Lepidopt.*, *Entom. forestière*.

9. Graves, Capt. Philipp. — London S. W. 7. Herefort Square 5. — *Lepidoptera*

10. Григориевъ, Б. — Ентомологъ, Дирекция Храноизноса. София. — *Entom. aesonom.*

11. Дончевъ, Ан. — Лекторъ по пчеларство въ Агрономическия факултетъ, София.

12. Дръновски, Ал. К. — Уредникъ на училищния Музей при М-ството Народ. Просв. — *Lepid.*, *Entom. aesonom.*

13. Дрънски, Д-ръ К. — Управителъ на Противомаларичния институтъ. Петричъ. — *Diptera*, *Culicidae*.

14. Дрънски, П. — Началникъ на Царската Ентомологична Станция, София-Двореца. — *Diptera*, *Arachnida*, *Pisces*, *Entom. aesonom.*

15. Димитровъ, Ал. — Гимн. уч-ль въ Стара-Загора. — *Lepidoptera*.

16. Димитрова, Д-ръ Ар. — Асистентка въ Университета въ София. — *Neuroptera*.

17. Дучевски, Б. — Инженеръ-химикъ. Представителъ на I. G. Farben Industrie, Achen.

18. Ebert, Heinz. — Leipzig S. III. Eichendorfsstr. 39. — *Lepidoptera (Rhopalocera)*.

19. Златарски, Д. — с. Абтарзакъ, Провадийско.

20. Ивановъ, Д-ръ К. — Лѣкаръ. — *Lepidoptera*.

21. Кантарджиева-Минкова, С. — Асистентка при Царската Ентомолог. Станция. София. — *Coleopt.*

22. Knirsch, D-r Ed. — Чехословакия Kolin, Stara posta — *Fauna cavernicola*.

23. Комарекъ, Д-ръ И. — Професоръ по Зоология, Директоръ на Държавния Опитенъ Горски Институтъ, Praha, II. u Karlova 3. — *Dipt.*, *Entom. forest.*

24. Консуловъ, Д-ръ Ст. — Извънр. проф. при Университета, София. — *Culicidae*. *Entom. aesonom.*

25. Кузевъ, К. Т. — Преподавателъ по горска зоология въ Техническото у-ще — София.

26. Лазаровъ, Асенъ. — Агрономъ. Агроном. факултетъ. — Entom. аесопом.

27. Лучникъ, С. — Директоръ на Ставрополския на Кавказъ Музей, Ставрополь-кавказскій, пощ. ящ. № 76.

28. Милде, Юл. — Лесничей, София. Красно-село.

29. Марковичъ, А. — Гимн. у-ль въ I. С. Д. М. Гимназия, София — Lepidoptera.

30. Михайловъ, Евг. — Агрономъ Землед. Катедра въ Плѣвень. — Entom. аесопом.

31. Моровъ, Проф. Д-ръ Т. — Професоръ по Зоология и биологъ при Инспектората по маларията, София. — Diptera, Culicidae.

32. Найденовъ, В. — Агрономъ, директоръ на българското земледѣлско дружество, София — Фитопатол., Entomol. аесопом.

33. Недѣлчевъ, Проф. Н. — Редовенъ професоръ по лозарството при Агроном. факултетъ София. — Entom. аесопом.

34. Папазовъ, Д. — Асистентъ при Царския Естествено исторически Музей въ София.

35. Патевъ, П. — Главенъ библиотекаръ при Царскитѣ Научни Институти, София-Двореца. — Protozoa.

36. Русковъ, М. — Редовенъ доцентъ по лесовѣдството при Агрономо-лесовѣдския факултетъ при Университета въ София. — Entom. forest.

37. Стойновъ, П. — Агрономъ при Землед. опитна станция. София, ул. „Царъ Асень“ 93. — Entom. аесопом.

38. Стателовъ, Н. — Агрономъ, Гара Костенецъ-Баня.

39. Стрибърни В. — Ботаникъ при Земледѣл. Изпит. институтъ, София.

40. Стрибърни, В. В. — Агрономъ, специалистъ-градинаръ. Плѣвень. — Entom. аесопом.

41. Тиховъ, Д-ръ М. — бившъ Редакторъ на списание „Ловецъ“. София.

42. Тошковъ, П. — Картографъ, преподавателъ по картография въ Техническото училище — София.

43. Тулешковъ, Кр. — Асистентъ при Царската Ентомологична Станция. София-Двореца — Lepidopt.

44. Фененко, Н. — Гимназияленъ учителъ въ гр. Горна Джумая. — Diversa.

45. Чипишевъ, В. — Агрономъ, Земледѣлска Опитна Станция. София, ул. „Аспарухъ“ 9. — Entom. аесопом.

46. Чорбаджиевъ, П. — Началникъ на Ентомолог. отдѣлъ при Земледѣлския Изпитателенъ Институтъ, София, — Lepidopt., Entom. аесопом., Iridae.

47. Цаневъ, Пан. — Препараторъ въ Зоолог. Институтъ при Университета. София.

Реферати и съобщения.

Д-ръ Ив. Бурешъ:

25. I. 1931. — Показа фотография на пеперудата *Rachyura otus* Dr. изпратена му отъ Д-ръ Мишинъ отъ Варна. Пеперудата е била уловена въ околноститъ на Варна презъ лѣтото на 1930 год. Това находище е за сега най-северната точка на разпространение на този видъ въ Европа.

Показа и 18 екземпляри пеперуди, уловени въ Кричимската царска курия при Пловдивъ на Богоявление 1931 год., т. е. презъ това време, когато въ България обикновено върлуватъ най-голѣмитъ студове. Тая година времето отъ 15. до 21. I. бѣ необикновено топло и насѣкомния свѣтъ се бѣ събудилъ вече отъ зименъ сънъ. Уловенитъ пеперуди принадлежатъ на видоветъ: *Biston hispidaria* Schiff., *Hybernia ruficaparra* Hb., *Hybernia leucophaearia* Schiff., *Hybernia bajaria* Schiff. *Phygalia pedaria* и *Нупена rostralis*, всички уловени вечерно време при електрическа свѣтлина. Денемъ хвърчеха *Vanessa urticae*, пчели, *Bombus* sp. и мухи.

6. II. 1931. — Съобщи за провъзгласяването на Н. В. Царъ Борисъ III за почетенъ членъ на Чехословашкото ентомологическо дружество. Показа и изпратената по тоя случай диплома.

21. V. 1931. — Показа представители отъ семейство *Buprestidae*, събрани въ България, Тракия и Македония. Богатиятъ материалъ отъ красиви видове е билъ опредѣленъ отъ видния пражски колеоптерологъ Dr. J. Obenberger и съдържатъ следнитъ видове: 1. *Capnodis cariosa* Pall. отъ с. Кюпрюлю, Кърджалийско 28. IV. 1925; 2. *Capnodis tenebrionis* L. отъ Карлово и София 3. V. 1923; 3. *Julodes onopordi* ssp. *ehrenbergi* C. G. отъ с. Богданци, Гевгелийско V. 1917 и отъ с. Бадома при Деде-Агачъ 1. V. 1914; 4. *Chalcophorela stigmatica* C. G. отъ Бургасъ 20. V. 1924; 5. *Chalcophora mariana* L. отъ Чехлюво и Триградъ въ Родопитъ 24. VI. 1924; 6. *Parotis lugubris* F. отъ Плевенъ, Сливенъ и Хасково 19. V. 1923; 7. *Dicerca alni* Frih. отъ Бѣлово; 8. *Dicerca berolinensis* Fbr. отъ Сливенъ, Люлинъ и Бѣлово; 9. *Buprestis haemorrhoidalis* L. отъ София VII. 1929 и Чехлюво 7. VII. 1925; 10. *Capnodis tenebricosa* F. Бургасъ 20. V. 1924; 11. *Buprestis flavofasciata* L. отъ Доспатски Родопи 6. VIII. 1925; 12. *Ptorima 11-maculata* α. *viturati* Pic. отъ Стара-Загора; 13. *Buprestis octoguttata* L. отъ Доспатъ 6. VIII. 1925; 14. *Buprestis rustica* L. отъ Чамъ Курия 24. VIII. 1926; 15. *Bupr. rustica* var. *signaticeps* Fleisch. отъ Чамъ Курия 24. VIII. 1926; 16. *Ptorima 11-maculata* ab. *6-maculata* Herb. отъ Стара Загора 1908; 17. *Ptorima cyclops* Mars отъ Бургасъ; 18. *Acmaeodera 18 guttata* ab. *Friwaldzskyi* Cg. отъ Стара-Загора; 19. *Acmaeodera ottomana* G. отъ Бѣлово въ Родопитъ; 20. *Acmaeodera pilosellae* Cg. отъ Бѣлово; 21. *Acmaeodera flavofasciata* Viell. отъ Лозенъ-планина

20. V. 1911; 22. *Eurythyræa austriaca* L. отъ Чепинско 18. VII. 1925; *Lampra rutilans* L. отъ Бѣлово въ Родопитѣ; 24. *Chrysobothris affinis* F. отъ Странджа-планина и Чепеларе VI. 1906; 25. *Anthaxia hungarica* Scop. ♂ отъ Бѣлово; 26. *Anthaxia hungarica* v. ♀ *subviolacea* Obenb. отъ Деде-Агачъ 10. IV. 1914; 27. *Anthaxia scorzonerae* Ksw. отъ Кричимската курия 30. V. 1919; 28. *Anthaxia millefolii* ssp. *polychloros* H. отъ Странджа пл. 23. V. 1923; 29. *Anthaxia aurulenta* v. *senicula* Schl. отъ Варна 17. V. 1928; 30. *Anthaxia salicis* var. *speciosa* Csiki отъ Бѣлово въ Родопитѣ; 31. *Anthaxia bicolor* Falder. отъ Бургасъ 11. V. 1911; 32. *Anthaxia fulgurans* Sch. отъ Лозенъ пл. 20. V. 1911 и отъ Бѣлово; 33. *Anthaxia nitidula* v. *rumelica* Obenb. отъ Германския манастиръ въ Лозенъ план. 10. VII. 1911; 34. *Anthaxia podolica* ab. *cyanifulgens* Obenb. отъ Лозенъ пл. 10. VII. 1911; 35. *Anthaxia podolica* Mann. отъ Бѣлово; 36. *Anthaxia cichorii* Ol. отъ Горна-Баня, Софийско; 37. *Agrilus sinuatus* Oliv. отъ Черепишкия манастиръ IV. 1906 и Враца 7. VII. 1906; 38. *Agrilus angustatus* Ill. изъ Кюстендилско 23. VI. 1907; 39. *Agrilus roscidus* Kgw. отъ София 12. VI. 1905; 40. *Agrilus sulcicolis* Redtt. (=elongatus) отъ Синделъ, Варненско 27. V. 1905; 41. *Agrilus viridis* var. *nocivus* Ratg. отъ Баташко блато 11. VIII. 1925; 42. *Agrilus albogularis* Gög. отъ Ксанти въ Тракия 24. IV. 1914; 43. *Agrilus angustulus* Ill.; 44. *Lampra mirifica* var. *picta* Obenb. отъ Централни Родопи 19. V. 1928; 45. *Lampra festiva* Kn. отъ Чепинско 18. VIII. 1925; 46. *Coroebus rubi* F. отъ с. Бѣлово и Странджа пл. 18. V. 1923. Проф. Обенбергеръ ще публикува въ скоро време въ Известията на Царскитѣ Научни Институти кн. V една обширна студия върху българскитѣ бупрестиди.

8. X. 1931. — Съобщи за смъртта на почетния членъ на дружеството Д-ръ Фр. Рамбоусекъ. Паметта на покойния бѣ почетена съ ставане на крака. Д-ръ Бурешъ говори за неговата научна дейность и специално за изучаванията му върху колеоптерната фауна на България. Показа неговитѣ научни публикации на брой около 100. Бележки за живота и дейността на покойния въ България и Македония ще бже напечатана въ кн. VII на Известията на Бълг. Ент. Д-во.

14. X. 1931. — Докладва за научната дейность на заслужилия за проучването на пеперудната фауна на България виенски ентомологъ проф. Д-ръ Хансъ Ребелъ, който на 2 септ. 1931 год. отпразднува 70 годишния си юбилей. Той е авторъ на първата монография върху пеперудната фауна на България и днесъ е директоръ на Държавния естествено-исторически музей въ Виена. Почетенъ членъ е на Българск. ентомологично дружество. Реши се юбиляра да бже поздравенъ съ подходяще писмо отъ страна на дружеството.

Докладва публикацията на Д-ръ Enderlein (IV Internat. Congres Entomol. 1928. Vol. II. p. 771—772), въ която се

твърди че бълхитѣ издаватъ звукъ, — цвъртятъ подобно на скакалцитѣ. Цвъртението се произвежда като триятъ грапавитѣ бедра на заднитѣ си крака върху коремнитѣ сегменти.

13. XI. 1931. — Показва 1 екземпляръ *Ptilophora plumigera* Esp. (Notodontidae) уловена отъ Н. В. Царъ Борисъ III въ Кричимската курия при гр. Пловдивъ на 11. I. 1931 год. До сега тая пеперуда бѣ позната въ 3 находища въ България: Сливенъ, Рилски манастиръ (2. XI. 1927) и парка Врана до София (28. XI. 1923). Въ последното находище намѣрена сжщо така отъ Н. В. Царъ Борисъ III. Не се предполагаше, че тоя видъ хвърчи и по срѣдъ зима, презъ срѣдата на януарий месецъ.

29. XI. 1931 г. — Показа наново откритата отъ него за фауната на Европа и България пеперуда *Janthinea Frivaldskyi* Dup.. Тая малка красива пеперуда е била уловена за пръвъ пѣтъ въ южна България отъ колекционеритѣ на Emeric Frivaldsky презъ 1833 или 1834 год.. Фривалдски не дава точното находище на тая пеперуда, а казва, че е уловена въ „Балканскитѣ земи“ и че ще бжде описана отъ Treitschke и наречена на негово име. Трайчке обаче не е далъ описанието за казания видъ; това е направилъ по-късно Duponchel, като го е нарекълъ *Janthinea Frivaldskyi* безъ да укаже кжде е уловена пеперудата. Бахметьевъ презъ 1902 год. писа че Фривалдски е уловилъ тоя видъ „между Станимака и Родопитѣ“, обаче Станимака се намира въ самитѣ поли на Родопитѣ, така че находището не е правилно указано, а и не се знае отъ гдѣ е почерпилъ Бахметьевъ тия данни. Още повече се забърка въпроса за установяване точното находище на тая пеперуда, когато въ каталога на *Staudinger* и *Rebel* (1901) погрешно бѣ поставено като находище „? Tura“ т. е. Туркестанъ вмѣсто „Турс.“ т. е. Турция; при това поставенъ бѣ предъ находището знака въпросителна. Презъ 1903 год. проф. Rebel въ известната своя *Studien* I. р. 232 писа „Нека се надѣваме, че въ скоро време ще се успѣе съ положителностъ да се докаже срѣщането на тоя красивъ видъ на Балканския полуостровъ.“ Трѣбваше да се изминатъ цѣли 100 години отъ намирането на първия екземпляръ отъ тая пеперуда въ Европа, за да се открие втора отъ мене въ Царската Кричимска курия при Пловдивъ на 22. V. 1921 г. Опредѣлението на вида по тоя екземпляръ бѣ извършено едвамъ презъ 1931 г. отъ Кр. Тулешковъ.

9. XII. 1931. — Показа нѣколко вида рѣдки пеперуди уловени отъ Н. Карножицки въ Варна, а именно: 1) *Phalera bucephaloides*; тая рѣдка пеперуда се различава отъ обикновената *Ph. bucephala* по това, че полумѣсечното петно у първата заема $\frac{2}{3}$ отъ външния ржбъ на предното крило, а у втория видъ само $\frac{1}{2}$ отъ тоя ржбъ. 2. *Eriogaster rimicola* Hb. 3. *Arctornis L-nigrum* Müll. 4. Новия за фауната на България

видъ *Calamia lutosa* Müll., гжсеницата на която живѣе въ стеблата на камъша. 5. *Dichonia aeruginea* Hb. 6. *Agrotis xathographa* Sch. 7. *Colias edusa tergestina* St. 8. *Catocala disjuncta* H. G. 9. *Apamea testacea* Hb. 10. *Agrotis ripae* Hb. 11. *Talpochares respersa* Hb. и др.

23. XII. 1931. — Показа твърдокрилитъ насѣкоми *Cleonus nigrosaturatus* Geoz. (Curculionidae) и *Chrysomela haemoptera* L. (Chrisomelidae), които сж били извадени изъ стомаха на единъ кикликъ — *Caccabis saxatilis*, убитъ въ Харманлийско на 5. X. 1931 г. Следъ като е билъ застрелянъ, киклика е престоялъ 4 дена и чакъ тогава е билъ изкорменъ. Следъ изваждането и разрѣзването на воденицата (стомаха) указа се, че въпроснитъ твърдокрили (3 екземпляри) сж били все още живи! Освенъ тѣзи брѣмбари въ воденицата е имало и много камъчета. Че сж престояли казанитъ хоботници 4 дена въ стомаха живи не е мжно обяснимо, като се има предъ видъ, че хитинената имъ покривка е извънредно дебела и яка, а освенъ това следъ смъртъта на киклика, въ неговия стомахъ не се отдѣля вече стомашенъ сокъ. Насѣкомитъ сж били погълнати отъ птицата вѣроятно кратко време преди тя да е била убита. Въ гушата на сжщия кикликъ е имало растителни части и житни зърна.

Дрѣновски Ал. К.

21. I. 1931. — Представи събранитъ отъ него по Алиботушъ презъ лѣтото на 1930 г. пеперудни видове и растителни дървеници, опредѣлени въ Виена отъ съответни специалисти. *Pyrallis manihotalis* Gn. (840), новъ за България. Отъ околността на Бургазъ, южно, при с. Мехмечкѡй, хванатъ на 30. VI. 926 г.; *Tegostoma comparalis* Hb. (1275), изъ околността на гр. Русе, VII. 1907 г. — *Rhynchota* (Heteroptera) отъ Алиботушъ, Люлинъ и центр. Стара пл. — Карлово: 1. *Musta serrata* L. Алиботушъ и Симитли на р. Струма; 2. *Yalla dumosa* L. на 1500 м, 2. VII. 930 г. Алиботушъ; 3. *Neottiglossa flavomarginata* Luc. Люлинъ, 5. VI. 929 г.; 4. *Carpocaris lynx* Fab., Алиботушъ, 1500 м, 28. VII. 930 г.; 5. *Oncosephalus squalidus* Rossi. Алиботушъ, 5. VI. 930 г. на 1000 м. вис.; 6. *Phytocoris ustulatus* HS. Алиботушъ 1500 м., 1. VIII. 930; 7. *Phytocoris incanus* Fieb. Алиботушъ 1500 м., 1. VII. 930; 8. *Stenodema calcarata* Fall. Алиботушъ 1500 м., 1. VIII. 930; 9. *Lygus apicalis* Fieb. Алиботушъ 1500 м. 1, VIII. 930; 10. *Poeciloscytus unifasciatus* F. Алиботушъ 1500 м. 1. VIII. 930; 11. *Calocoris sexguthatus* F. Карловски балканъ, 1400 м, 22. VII 928; 12. *Pycnopterna striata* L. Осогова пл. 2253 м, 13. VIII. 926; 13. *Adelphocoris vandalicus* Rossi. Алиботушъ 1500 м. 30. VII. 930.

28. I. 1931. — Показа следнитъ нови пеперуди, хванати отъ него по Алиботушъ, презъ 1930 г.: 1. *Agrotis obelisca*

Hb. (1387) на височ. 1500 м., на 28 юлий; 2. *Dischorista fissipuncta* Hw. (2111) въ с. Гайтаниново, на 23.VII; 3. *Eupithecia pimpinelata* Hb. var. *lantoscata* Mill. (3553) (det. Rbl) на 1500 м., 25 юлий. Новъ за България. 4. *Eupith. denotata* Hb. (3563) (det. Rbl.) на 1500 м., 38. VII. Новъ за България. 5) *Eupith. scripturata* HS. (3616) на 1000 м. вис., на 8. VI. Глациаленъ видъ, рѣдѣкъ у насъ (det Rbl.). Още непознатъ отъ Алиботушъ; 6) *Eupith. cucullaria* Rbl. (det. Rbl). на 750—1000 м. на 12. юний. Новъ за България; 7) *Eupithecia pumillata* Hb. на 750—1000 м. 15 юний. Другъ глациаленъ видъ, рѣдѣкъ у насъ. (3658) Познатъ ми е още и отъ Витоша, на 750 м. вис. с. Княжево, 31.VIII. 1928. (aberr.) det. Rbl, отъ дето още не бѣше известенъ. Сжщо и отъ Бачковския манастиръ имамъ екземпляри. — 12. VI. 1923.

11. II. 981. — Говори за новооткрития отъ него въ България микро — видъ *Crambus mytilellus* Hb. (84), det. Kolar, събиранъ по Алиботушъ пл. презъ лѣтото на 1930 г. въ много екземпляри вечеръ на лампа, на вис. 750—1500 м. Изъ находищата на сродния му видъ *pinellus* L. се срѣща често въ чисти екземпляри презъ юлий и августъ, отъ който на пръвъ погледъ трудно се различава. Много екз. отъ *mytilellus* сж били изпратени на специалисти въ Виена, дето сж проучени основно и опредѣлени като такива. Този видъ е познатъ до сега отъ центр. Европа, ю. Италия, Босна и Херцеговина, Мореа, Скандинавия, Сибиръ, Брусa и Армения. При основното преглеждане на многобройния си материалъ отъ р. *Crambus* изъ цѣла България се указа, че видътъ *mytilellus*, въ желтитъ му екземпляри, се срѣща навсѣкжде у насъ заедно съ сродния му по-обикновенъ видъ *pinellus*. Така, имамъ данни отъ Софийско, Конева пл., Родопи центр. Стара пл., Пиринъ, с. Крупникъ, с. Симитли. Сжщо има много материалъ отъ вида изъ ю.-зап. Македония — план. Галичица, отъ дѣто сжщо не е билъ известенъ до сега *Cr. mytilellus* Hb. Освенъ това, на Алиботушъ той е открилъ презъ двегодишнитъ си екскурзирания и проучвания тамъ до 13 разни вида *Crambus*, отъ които следнитъ сж нови за България: *fulgidellus* Hb., *margaritellus* Hb., *mytilellus* Hb. Той е открилъ още и нашия ендемиченъ видъ *Cr. biformellus* Rbl. въ формата *majorellus* Drenow., която, обаче, има най-голѣмо сходство съ сжщата отъ Стара пл., а не напр. съ ония по сжседнитъ Пиринъ и Родопи.

24. II. 931. — Представи мъжки и женски екземпляри отъ новия за България видъ *Gnophos certithus* Rbl и. Zerny, събрани отъ него на Алиботушъ, презъ 1930 г. юлий и августъ. Тамъ този видъ хвърчи заедно съ сродния му видъ *pullatus* schiff.

Видътъ *certithus* е новоописанъ отъ Rbl и. Zerny, произходящъ изъ разни държави на Балканския полуостровъ, а

нарисуванъ отъ тѣхъ въ студията имъ за *Албания*, р. 114—115. Тѣ не сж притежавали женски екз. отъ вида, каквито обаче азъ имъ доставихъ на скоро следъ напечатването на студията.

Освенъ това направи съобщение съ показанъ материалъ отъ една нова форма отъ вида *Gnophos certiathus* Rbl u. Zerny, открита отъ него върху многоброенъ материялъ — 56 екз. по Алиботушъ.

1. *unicolor* nova var. m. съ еднобойни тъмно-сиви и каф.-желтеникавъ оттенъкъ по горната стр. на крилата; безъ напречни лакатушни черни връзки-линии, но съ срѣднитѣ елиптически петна по горн. стр. на крилата.

Долната стр. на крилата сжщо като у типичнитѣ *certiathus*. Само 1 типиченъ ♀ екз. и ♂ преходенъ.

Новъ видъ пеперуда за фауната на България е и *Cidaria (Lorentia) firmata* Hb. (3321), хванатъ на Алиботушъ презъ юлий 1980, на височина 1500 м. около лѣтния пограниченъ войнишки постъ „Ст. Караджа“ вечеръ на лампа, южно отъ с. Парилъ.

По свѣла виолетовосивата основна боя и потъмнената срѣдна връзка на пр. крила, спор. Seitz, отговаря на формата *ulicata* Rhb. отъ южна Франция, Кастилия и южна Австрия.

Показа сжщо и новитѣ форми за нашата фауна: *Cidaria fulvata* var. *distinctata* Stgr. и ab. *degenerata* Sit. хванати на Алиботушъ, юлий 1930 г.

Заедно съ тия последни той е хваналъ и рѣдкия у насъ видъ *Gnophos supinarius* var. *intermedia* Wehrli, на вис. 1000—1500 м., юлий 1930 г. познатъ до сега въ нѣколко екз. отъ него, хванати при с. Курило и Реброво покрай р. Искъръ, 23. V. 1926 г.

27. I. 1932 г. — Показа събранитѣ отъ него на Алиботушъ, презъ лѣтото на 1929 и 30 г. бръмбари (Coleoptera), опредѣлени въ Виена отъ специалисти въ Naturhistorisches Staatsmuseum, именно:

Zabrus rhodopensis Apf., *Exosoma thoracicum* Redt., *Leistus spinibarbis* Chd., *Rhagonycha* spec. ?, *Ophonus sabulicola* var. *columbinus*, *Opilo domesticus* Stm., *Abblataria laevigata* var. *gibba*, *Dendarcis mossonicus* Brüll., *Pimelia polita* Sol., *Acanthocinus griseus* F., *Saphannus Ganglbaueri* Brams. Показа сжщо тъй и една форма отъ ципестокрилитѣ насѣкоми — Mutillinae (Hymenopt. Aculeata), именно *Barymutilla arenaria* var. *brutia* (aut. ?), хваната на Алиботушъ, 1500 м. вис., на 10. VI: 930.

Въ статията на Д-ръ Ив. Бурешъ: „*Mutillidae (Hym. Aculeata) gesammelt in Bulgarien, Thracien u. Macedonien*“. (Въ Известия на Бълг. Ент. Д-во Кн. I. 1924, р. 36), не се съобщава за вида *Var. arenarda*, поради което да се смѣта че е новъ за България, сжщо и за планината Алиботушъ. На последната е билъ хванатъ до сега само вида *Tropidotilla littoralis* Ptn.

23. XII. 1931. — Направи своя трети приносъ къмъ перурдната фауна на пл. Алиботушъ, като показа събранитѣ отъ него тамъ презъ 1930 г. още 33 разни видове. Най голѣмо внимание заслужава откритиятъ отъ него тамъ новъ микровидъ *Pempelia alibotuschella* Drenow, на който даде подробно описание и диагноза на нѣмски.

Отъ редъ години той е събиралъ и листни оси — Tenthredinidae, отъ които показва 43 разни видове. Тѣ сж били опредѣлени отъ специалиста Dr E. Enslin въ Fürth. 25 вида сж нови за насекомата фауна на България, които сж:

Arge ciliaris Zaad, *Arge enoides* L., *Schizocera furcata* melanocephala Pr., *Athalia rufoscutellata* nigroscutellata Knw., *Empria abdominalis* F., *Empria longicornis* Thms., *Dolerus anthracinus* Kl., *Dolerus picipes* Kl., *Pachynematus cleitelatus* Lap., *Pachynematus Lichtwardtii* Kw., *Pteroradea myosotidis* F., *Emphytus didymus* Kl., *Emph. did. var. fumatus* Andre., *Rhadinocerae nodicornis* Knw., *Rhadinocerae Reitteri* Knw., *Monophadnus elongatulus*, *Macrophyla pallidiolabris* Costa, *Priophorus padi* L., *Tentredopsis paroncha* var. *artilabris*, *Tentredopsis narsata* L., *Tentredo atra* var. *Scopoli* Lep., *Tentredo ferruginea* var. *rufipennis* F., *Tentredo fagi* Panz., *Allantus* Rossi var. *obessus* Mors., *Megalodontes exornatus* Zadd.

Останалитѣ видове произхождатъ отъ други находища, които Н. Недѣлковъ (†) въ своя седми приносъ къмъ насекомната фауна на България, 1914 г., не споменава на стр. 204—210.

Следъ тия, той показва и други три листни оси, които сж нови за науката, именно: *Pamphilus nova* sp. отъ Карлово — на 12. VI. 1912, *Allantus subaricusis* Mds var. *nova* отъ София, на 16. VII. 1920 и *Tentredopsis Frisei* Knw. nov. var. отъ Алиботушъ, на 1400 м. височина — 10. VI. 1929. Тѣ ще бждатъ описани отъ казания по-горе специалистъ.

Дрѣнски П.

21. I. 1931. — Съобща за уловения *Galeodes graecus* Koch. при с. Ораново, южно отъ Горна Джумая. Съ това находище не само разпространението на този видъ се разширява и на северъ отъ Кресненското дефиле, но се очертава и най-северната му точка на разпространение при с. Ораново, южно отъ Горна Джумая, близо на 42° северна ширина и 23°6' източна дължина.

28. I. 1931. — Съобща за комисията отъ специалисти, която ще заседава на 28 т. м. въ Министерството на земледѣлнето по въпроса за рапичния брѣмбаръ *Entomoscelis adonidis*. Въ тази комисия участвуватъ членоветѣ на Дружеството: Йоакимовъ, Дрѣнски, Чорбаджиевъ, Григориевъ, Стойновъ и Лазаровъ.

6. II. 1931. — Посочи *Anopheles bifurcatus* отъ Карабунаръ, уловенъ да лети въ края на януарий. — Това не е странно, тъй като комаритѣ презимуватъ като възрастни, а ранното затоплюване на времето ги е пробудило отъ тѣхния зименъ сънъ.

11. III. 1931. — Посочи брѣмбара житенъ бѣгачъ *Zabrus balcanicus*, който презъ м. мартъ се появилъ масово по зимнитѣ посеви въ Павликени. Съобщи, че този брѣмбаръ е нанесълъ чувствителни повреди на зимнитѣ посеви. Като сръдство за борба съ тѣхъ препоръча: събиране ларвитѣ и брѣмбаритѣ и унищожаването имъ. Препоръча и смѣна на културитѣ.

14. X. 1931. — Съобщи, че презъ време на екскурзията си до Генишъ Ада (Варненско) събралъ множество пашкули отъ рѣдката у насъ пеперуда *Pachypasa otus*, които изхвъркнали въ Царската Ентомологична станция на 2. VII. 1931 г. Нѣкои отъ изхвъркналитѣ пеперуди копулираха и се полуха яйца, които се излупиха къмъ края на м. юли.

За отбелязване е факта, че *Pachypasa otus*, която се смѣта за рѣдка пеперуда, въ Генишъ Ада (Варненско) има широко разпространение.

21. X. 1931. — Говори върху масовото разпространение на птичитѣ кърлежи: *Argas persicus* и *A. reflexus*, въ кафезитѣ на Зоологическата градина, които презъ лѣтото сж предизвикали и болестъта „*Spirochetosis avium*“ по грабливитѣ птици въ градината, съ голѣмъ $\%$ смъртни случаи. За тѣзи кърлежи и за сръдствата за борба съ тѣхъ се публикува малко съобщение въ настоящитѣ известия кн. 7, въ статията: „Малки ентомологически бележки.“

23. XII. 1931. — Въ връзка съ положителното установяване на: *Galeodes graecus* C. L. K., *Clemis caspica* и нѣкои други рѣдки, но много характерни въ зоогеографско отношение видове, говори за връзката на фауната на Левуново-Петричката долина на р. Струма съ тая на Мала Азия и южна Русия.

24. II. 1932. — Съобщи вреднитѣ брѣмбарчета:

1. *Lophocaterus pussillus* Klng., сиамски зърноядъ. — У насъ въ колониалнитѣ магазини по разнитѣ зърна: жито, оризъ, индийското орѣхче, сусамъ, кимелъ, анасонъ, бахаръ, соя, брашното и други зърнени храни.

Географско разпространение: Сиамъ, Ява, Цейлонъ, Либерия, Суринамъ, Перу, Чили, сев. Америка. Пренесенъ е и въ Европа, отъ кждето е познатъ отъ Франция, Берлинъ, Хамбургъ.

Ларвата му напада зърната и изпояжда вжтрешноститѣ имъ, както прави у насъ гъгрицата (*Calandra granaria*).

Борбата сжщо, както при гъгрицата. Но най-сигурното сръдство е опушване съ цианкали.

2. *Anobium (Sitodrepa) paniceum* L. — приструвачъ хлѣбно бръмбарче. — Нарича се така, защото обезпокоено, пада и се приструва на мъртво. Най-често изъ колониалнитѣ магазини и складоветѣ. Яде най-различни вещества: кафе, чай, аптекарски материали, брашно, хлѣбъ, тестени работи, книга, мумии и др. — Особено за книгитѣ е голѣмъ вредителъ. Изобщо той е единъ отъ най-обикновенитѣ кжщни вредители и ларвата му напада всичко, каквото ѝ попадне.

Космополитно разпространенъ.

Борба. За да се узнае присѣтствието му не е мжчно. Възрастнитѣ обичатъ светлината и винаги отиватъ къмъ прозорцитѣ. Тукъ тѣ могатъ да се избиватъ масово. — Ларвитѣ могатъ да се унищожатъ само чрезъ опушване помѣщенията съ цианкали.

6. IV. 1932. — По материяли отъ Опитното тютюнево поле въ Горна Джумая, съобщи че малкото бръмбарче *Ptinus latro* нападнало тютюневото семе и причинило доста голѣми щети.

Говори и за Гастрофилитѣ по конетѣ, за които дава и специално съобщение въ своитѣ: Малки ентомологични бележки, които се печататъ въ Известията, кн. VII.

Йоакимовъ Д.

11. II. 1931. — Съобщи и говори за пеперудата *Heliothis dipsacea*, като неприятелъ по царевицата. Гжсеницитѣ на тая пеперуда нападатъ още млѣчнитѣ зърна на царевицата.

11. X. 1931. — Показа три вида Cicadinae отъ сем. Membracidae: *Centrotus cornutus*, *Gayara genistae*.

27. I. 1932. — Показа единъ екземпляръ *Saturnia spini*, излупенъ презъ януари, както и рѣдкото насѣкомо *Mantispa perla* отъ с. Турия, Казанлъшко. Сжщото насѣкомо е ловилъ и П. Дрѣнски отъ Берковица и с. Пиринъ, Св. Врачко. Съобщилъ и бръмбара отъ сем. Pythidae, *Phinosimus ruficollis* L.

Кантарджиева С.

11. II. 1931. — Съобщи и показа 28 видове и форми отъ р. Dorcadion (сем. Cerambycidae), отъ които 14 видове и форми нови за фауната на България (det. D-r L. Heyrovsky — Прага) и единъ новъ видъ за науката, описанъ отъ D-r L. Heyrovsky, и нареченъ на името на Н. В. Царъ Борисъ — именно Dorcadion Borisi. Новитѣ 14 вида сж:

1. *Dorcadion fulvum* var. *nigripenne* Fleisch — отъ Драгоманъ.

2. *Dorcadion equestre* Laxm. — отъ Сливенъ и Конюва пл.

3. „ „ var. *exclamationis* Thoms. — отъ Битоля.

3. *D. equestre* var. *Noelli* Fairm. — Драгоманско блато.

4. „ „ var. *niveoconjunctum* Th. — Люлинъ, Драгоманско блато.

5. „ „ var. *reclinatum* Kraatz. — България.

6. *D. Scopolli* Hbst. — отъ Пловдивъ, Родопи и Пазарджикъ.
var. *convexicollе* Küst. — отъ Вратца.
 7. *D. Krüperi* Gangl. — отъ Битоля.
 8. *D. bilineatum* var. *unicolor*. Csiki — Свищовъ и Пловдивъ.
 9. *D. Sturmi* Friv. — ендемиченъ за България видъ — отъ Пловдивъ, Карлово, Пазарджикъ, Кричимъ, Белово (Родопи).
 10. *Dorcadion pedestre* var. *gogium* Thoms. — отъ Странджа пл., Пловдивъ и София.
 11. *D. gallipolitanum* Thoms. — отъ Беласица, Текиръ-Дагъ.
 12. *D. lineatocolle* Kraatz — отъ София, Кръсненско дефиле.
 13. *D. septemlineatum* a. *apicale* Thoms. — Търново.
 14. *D. condensatum* Küst. var. *punctipenne* Küst. — отъ Сливенъ.
27. I. 1932. — Показа 10 нови за България видове и форми отъ сем. *Cerambycidae*. (Подробно съобщение за тѣхъ въ статията: „Видоветъ отъ сем. *Cerambycidae* въ България.“

Патевъ П.

28. I. 1931. — Реферира „История на приложната ентомология въ Свѣта“ — американско издание, голѣмъ томъ отъ 564 страници. Въ това издание има сведения и за България. Цѣлата история на Ентомологията въ България се прочете изцѣло. Помѣстени сж портретитъ на много ентомолози. Понеже има сведения и за ентомологията на съседитъ, следния пжтъ ще се направи едно сравнение между странитъ на Балканитъ.

23. XII. 1931. — Прочете нѣкои статистически бележки за богатството на Британския музей въ Лондонъ.

Тулешковъ, Кр.

14. X. 1931. — Показа *Plusia deaurata* отъ Търново и *Dispassa salicicola* отъ Лонгоза, Генишъ-Ада.

21. X. 1931. — Показа ловената отъ него по брѣга на р. Струма при гара Генералъ Тодорово, Петричко и опредѣлена въ Берлинския музей *Cicindela fischeri*.

23. XII. 1931. — Показа новия за България и много рѣдкъ видъ пеперуда *Hiptelia apfelbecki* Rbl., уловенъ отъ него въ 4 екз. на Бѣласица на 5. VI. 1929. Говори за екскурзията си по Западния балканъ до върха Миджуръ и показва отъ тамъ пеперудитъ: *Erebia epiphron orientalis*, *Agrotis polygona* и пр.

22. I. 1932. — Показа новия за България видъ пеперуда отъ Али-Ботушъ пл. *Catocala nymphaea* Esp. и новия подвидъ за науката *Agrotis lucerneae bureschi* Tul. уловенъ по Бѣласица въ 2 екз. и на Западния балканъ 1 екз.

10. II. 1932. — Показа новия за науката сортетъ пеперуда *Lycaena orbitulus rebeli* Tul., ловенъ отъ него по Али-Ботушъ пл. на 29. VII. 1930 г.

24. II. 1932. — Чете за живота и научната дейностъ на Августъ Форелъ.

Чипишевъ.

6. II. 1931. — Съобщи, че при Министерството на Земледѣлието и държ. имоти се урежда „Курсъ за агрономи“. Въ този курсъ се застъпвалъ и предмета Приложна ентомология. Предложи и събранието прие да се отпуснатъ 20 екземпляри отъ последната книжка VI на известието, които да се раздадатъ на курсиститѣ агрономи.

Чорбаджиевъ П.

10. XII. 1930. — Говори за пеперудата *Heliothis armigera* като неприятелъ по царевицата у насъ. Гжсеницитѣ на тази пеперуда изяждатъ млѣчнитѣ зърна на царевицата.

11. II. 1931. — Реферира статията на Сокановски за короядитѣ въ Русия.

4. XI. 1931. Съобщи за нѣкои неприятели на щитоносната въшка по розитѣ *Physokermes bulgarensis* въ България, а именно:

1. Гжсеницитѣ на пеперудата *Oratocelis communimacula* Нб., които се хранятъ съ младитѣ и възрастни щитоносни въшки. Сжщитѣ нападатъ и щитоносната въшка *Lecanium corni* Вché.

2. Ларвитѣ на бръмбарчето *Brachytarsus scabrosus* F. живѣятъ подъ щита на щитоносната въшка и изяждатъ яйцата и ларвитѣ имъ. Сжщиятъ неприятелъ е намѣренъ освенъ по щитоносната въшка на розитѣ, още и по щитоносната въшка *Lecanium corni*.

Освенъ отъ горнитѣ два неприятели щитоносната въшка по розитѣ се напада и отъ единъ твърде малъкъ паразитъ отъ групата Chalcididae, още не опредѣленъ.
