

СЪВРЕМЕННИ МЕТОДИ ЗА БОРБА СЪ ВРЕДНИТЪ НАСЪКОМИ.¹⁾

Отъ Пенчо Дрънски

(Секретаръ на Българското ентомологично дружество).

Вредителитѣ по културнитѣ растения, горитѣ и домашнитѣ животни у насъ сж толкозъ много и отъ такова разнообразно естество, че не се минава година безъ загуби отъ тѣхъ. Едни нападатъ културнитѣ растения и често унищожаватъ почти цѣлата реколта, а понѣкога правятъ дадена култура невъзможна за известни мѣстности нѣколко години подъ редъ. Филоксерата, която унищожи старитѣ лозя, е единъ много-добъръ примѣръ въ това отношение.—Други нападатъ масово горитѣ, като имъ причиняватъ непоправими щети. Гжсеницитѣ на боровата процесионка, Тауматороеа ругиуса траоголи въ последнитѣ 7-8 години съ стотици хектари борови гори въ Родопитѣ, Пиринѣ и другѣде, прогони дивеча отъ тѣхъ и дълго време още ще се чувствуватъ последицитѣ отъ нейнитѣ нападения.—А трети, като лоши врагове, нападатъ домашнитѣ животни и човѣка и имъ причиняватъ редица разстройства даже и смъртъ. Въ нѣкои случаи тѣ сж способни съ ухапванатия си да ги убиятъ, както това правятъ черниятъ отровенъ паякъ, *Lathrodectus tredecimguttatus* въ Южна България и злата муха, *Simulia* въ Берковско. А въ други случаи тѣ се явяватъ като разпространители на опасни болести и епидемии: малария, петнистъ тифъ, тридневна (папатацийна) треска, антраксъ и други, които могатъ да взематъ не малко жертви и по такъвъ начинъ да лишатъ стопанитѣ отъ работни ржце и добитъкъ презъ най-усиления сезонъ за работа. И най-важното е че, каквато и да е годината, гдето и да се отгледва едно растение или животно, въ полето или въ балкана, въ кжщи, въ градината или въ гората, въ склада или хамбаря — въ всѣко време и на всѣкѣде можемъ да наблюдаваме какъ множество неприятели рушатъ труда и надеждитѣ на нашиятъ трудолюбивъ стопанинъ и му причиняватъ тежки и често непоправими щети и загуби.

¹⁾ Беседа, държана на тържественото юбилейно събрание на Българското ентомологично дружество, на 5 мартъ 1934 година.

Споредъ едно общо и приблизително изчисление, тѣзи загуби възлизатъ надъ 2 милиарда лева годишно, а нѣкои ги изчисляватъ много повече. По отрасли, тѣ се разпредѣлятъ:

Овощни градини . . .	30%	отъ общия год. доходъ				
Зърнени храни . . .	15—20%	"	"	"	"	"
Тютюница	25%	"	"	"	"	"
Лозя	35—40%	"	"	"	"	"
Захарно цвекло . . .	10%	"	"	"	"	"
Зеленчукови градини	20%	"	"	"	"	"
Рапица	30—40%	"	"	"	"	"
Гори	15%	"	"	"	"	"
Домашни животни	25—30%	"	"	"	"	"
Пчели	50—60%	"	"	"	"	"

Това сж загуби, които говорятъ за страшното разхищение на което е подложенъ трудътъ на нашиятъ стопанинъ и които сж въ състояние да компрометиратъ и убиятъ у него всѣкаква наченка и инициатива въ по-голѣмъ мащабъ.

България не е обетована земя, че да не държи смѣтка за тѣзи загуби. Като земледѣлска страна, тя най-вече страда и чувствува тѣзи загуби. А това ѝ налага да вземе всички мѣрки, които съвременната наука и практика ѝ даватъ, за да намали до минимумъ тѣзи загуби и да увеличи доходността на вложения трудъ.

Съвременната „растителна защита“ е въпросъ на рентабилитетъ. Увеличаването на реколтата е въпросъ отъ съществено значение, сложенъ и у насъ отдавна на теоретично и практично разискване. Борбата съ вредителитѣ по културнитѣ растения е първата стѣпка къмъ разрешаване проблема за увеличаване реколтата, рентабилитета.

Благодарение на това схващане, днесъ методитѣ, съ които си служимъ въ борбата съ вредителитѣ по културнитѣ растения, горитѣ и домашнитѣ животни, сж толкозъ много усвършенствувани и отъ такова различно естество, че за да могатъ по-добре да се схванатъ и преценятъ, налага се тѣхното прегрупиране и систематизиране.

Основнитѣ съвременни методи за борба съ вреднитѣ на сѣкоми сж:

1. Културно-предпазителни мѣрки
2. Биологиченъ методъ
3. Химични сръдства
4. Физични сръдства
- и 5. Механични сръдства.

1. Подъ културно-предпазителни мѣрки се разбиратъ всички профилактични, предпазни мѣрки, които целятъ да отнематъ възможността на вредителитѣ да се развиятъ и размножатъ, както и да създадатъ по-благоприятни условия за заздравяването и засилването на културитѣ и да

ги направятъ по-упорити и невъзприемчиви на болести и неприятели. Като такива мѣрки за сега сж познати: а) преораване и торене на почвата; б) смѣна на културитѣ; в) плевене и унищожаване на буренитѣ; г) изборъ на подходящо семе и третиране на семето; д) подборъ на раса и подобренеието ѝ (селекция) и други.

Като изключимъ последното срѣдство, всички други сж познати и нашироко прилагани у насъ методи. Последниятъ методъ е въпросъ на научно-изследователска работа и днесъ у насъ по този пжтъ имаме създадени редица устойчиви сортове жита, овесъ и др.

2. Механичнитѣ срѣдства сж познати на всички. Това сж:

а) Събиране на неприятелитѣ съ сакове, платнища и черги и унищожаването имъ, което съ успѣхъ се прилага къмъ още малкитѣ и недоразвили се скакалци;

б) Очукване или одрусване дърветата, което се прилага при борбата съ нѣкои вредители по овощнитѣ дървета и

в) Изрѣзване на нападнатитѣ части и гнѣздата на неприятелитѣ по дърветата.

Това последното срѣдство е особено ефикасно при борбата съ *златозадницата*, *Portesia chryzoroe* и бѣлата овощна пеперуда, *Aporia crategi* по овощнитѣ и паркови дървета. А въ 1926 год., по инициативата на Н. В. Царѣтъ, този начинъ се опита да се приложи и по отношение *боровата процесия*, *Taumatocora pythiocrampa* по боровитѣ гори въ Родопитѣ. Както се знае, боровитѣ гори въ Родопитѣ сж пламнали отъ гжсеницитѣ на тази пеперуда. Цѣли площади хубави борови гори сж унищожени, дивечѣтъ отъ тѣхъ е прогоненъ. Съ свой срѣдства Н. В. Царѣтъ нареди да се закупятъ ножици, триончета и всичко необходимо за изрѣзване на гнѣздата по върховетѣ на боровитѣ гори и изпрати свои хора инструктори, които да подготвятъ населението на засегнатитѣ райони въ Родопитѣ за тази борба. Опититѣ дадоха много-добри резултати.

3. Физически срѣдства. Това сж познатитѣ срѣдства за убиване неприятелитѣ чрезъ висока температура, изгарянето имъ съ огънь, или привличането имъ съ свѣтлина и унищожаването имъ. Тѣ се употрѣбаватъ въ различни случаи: при борбата съ човѣшкитѣ паразити — обезвѣщаване (чрезъ испарване), чрезъ горене съ слама на малкитѣ недоразвити скакалци, чрезъ привличане съ свѣтлина на сивата ливадна пеперуда и други неприятели.

Въ последно време се правятъ опити да впрегнатъ и електричеството въ борбата съ вреднитѣ насѣкоми, но резултатитѣ въ това направление още не сж напреднали до тамъ, че да иматъ едно практическо приложение.

4. Биологиченъ методъ. Той се състои въ използването на болеститѣ и неприятелитѣ, които вредителитѣ на културнитѣ растения иматъ и чрезъ искусственото имъ размножаване и разпространяване, да се унищожатъ самитѣ вредители.

Къмъ този методъ се числятъ:

а) Покровителството на насѣкомояднитѣ птици и бозайници, което у насъ се урежда съ Закона за лова;

б) Искусственото размножаване на паразитни и хищни насѣкоми, които сж познати като естествени неприятели на вреднитѣ насѣкоми по културнитѣ растения и

в) Култивирането и разпространяването на инфекциозни бактериини болести, познати като опасни за вредителитѣ.

Последнитѣ два методи у насъ не сж приложени. Но въ Америка тѣ сж едни отъ главнитѣ срѣдства за борба съ вредителитѣ по културнитѣ растения.

Забележителна е въ това отношение борбата съ *Lymantria dispar* (гжботворката) въ Америка. Пренесена отъ Европа въ Америка, тази пеперуда е намѣрила тамъ благоприятни условия и се е развила до такава степенъ, че сериозно е застрашила овощнитѣ култури. Американцитѣ, при търсене на срѣдства за борба съ нея, сж се спрѣли на факта, че тя въ своята родина (Европа), макаръ и да я има — не е вредна. За да разбератъ причинитѣ на това явление, въ 1926 год. тѣ изпратиха отъ Америка въ Европа двамина ентомолози съ специалната задача да проучатъ живота на тази пеперуда у насъ въ България, въ връзка съ нейнитѣ естествени неприятели. И тѣ установиха, че у насъ нѣколко паразити ципокрили по яйцата и гжсеницитѣ на тази пеперуда спиратъ нейното развитие до степенъ на вредна. Тѣ събраха отъ тѣзи ципокрили паразити, пренесоха ги въ Америка, кждето ги размножиха въ голѣмо количество и ги пуснаха на свобода. Вжтре въ нѣколко години тѣзи паразити сж се размножили толкозъ много, че вредитѣ отъ гжсеницитѣ на тази пеперуда въ Америка сж сведени до степенъ, каквито сж и у насъ.

Сжщото става и съ искусственото размножаване на нѣкои патогенни бактерии, носители на страшни епидемии срѣдъ вреднитѣ насѣкоми по културнитѣ растения. Този методъ съ успѣхъ е приложенъ отъ проф. Металниковъ отъ Пасторовия институтъ въ Парижъ, който презъ 1930 година бѣ нашъ гостъ. Проф. Металниковъ е успѣлъ да изолира редица болезнотворни бактерии отъ разни видове гжсеници и насѣкоми и да ги култивира искусствено въ твърде евтини срѣди, като на картофи, напримѣръ. Много отъ тѣзи бактерии даватъ спори, които могли да се запазятъ дълго време въ сухо състояние. По този начинъ Проф. Металниковъ намѣрилъ метода за получаване на голѣмо количество заразителенъ прахъ за много насѣкоми, познати като вредни. Прѣскаването на този прахъ изъ полетата или горитѣ, нападнати отъ

вредители, било съ аероплани, или съ други сръдства, безъ да вреди на другитъ животни, предизвиква опустошителни епидемии между вреднитъ насѣкоми и по този начинъ се спасяватъ земледѣлскитъ култури и горитъ отъ унищожение. Първитъ опити за борба съ вредителитъ по този методъ проф. Металниковъ приложи презъ 1929 год. въ Загребъ — Югославия при борбата съ *царевичната пеперуда Pirausta nubilalis* съ отлични резултати.

3. Други едни сръдства за борба съ вреднитъ насѣкоми сж, както казахме, химическитъ сръдства. Това сж най-познатитъ и широко прилагани сръдства както у насъ, тѣй и въ чужбина. Като най-употрѣбими хим. сръдства сж:

а) Пръскане съ химични разтвори, познати като контактни и вътрешни отрови,

б) Пръскане съ химични прахове, сжщо познати като контактни и вътрешни отрови,

в) Мазане съ разни химически вещества: варно млѣко, мехлеми и пр.,

г) Опушвания съ димъ или отровни газове (дихателни отрови),

д) Привличане вредни насѣкоми съ отровни примамки,

е) Петролизиране на блатата и

ж) Вътрешна терапия на растенията.

Всички тѣзи сръдства сж нашироко прилагани въ чужбина, кждето, както ще видимъ следъ малко, за прилагането имъ се употрѣбаватъ разни машини и особено аероплани. Чрезъ аероплана става възможна борбата на една широка площъ и най-вече борбата съ нѣкои опасни вредители на горитъ, която борба по други начинъ е невъзможно да се организира и води.

Съ изключение на „опушванията съ димъ и отровни газове“ и „вътрешната терапия у растенията“, всички други химически сръдства и методи сж широко прилагани и у насъ за борба съ маларията и вредителитъ по житнитъ растения; лозята, овоц. дървета, зеленчуковитъ градини, рапицата, тютюницата и т. н. Съ такива сръдства отъ нѣколко години у насъ съ успѣхъ се води организирана и планофърна борба съ *рапицниятъ бръмбаръ*, *гжсеницитъ на сивата ливадна пеперудка*; *скакалицитъ*, *гроздовиятъ молецъ*. Съ сжщитъ сръдства презъ 1926 година се поведе масова, но твърде неорганизирана борба съ неприятелитъ по сливовата култура въ Кюстендилско.

Чрезъ петролизиране на блатата у насъ се води успѣшна борба съ ларвитъ на маларичнитъ комари. Този начинъ за борба съ комаритъ у насъ, комбиниранъ съ други познати сръдства, е допринесълъ твърде много за ограничаване на маларията у насъ, особено въ Бургаско, Пловдивско и Петричко.

Това сж познатитѣ за сега срѣдства за борба съ вреднитѣ насѣкоми по културнитѣ растения, горитѣ, дом. животни и човѣка. При масовата и въ голѣмъ мащабъ борба съ тѣзи вредители, най-често тѣзи срѣдства се комбиниратъ и употребяватъ по нѣколко заедно и едновременно и така осигуряватъ крайниятъ успѣхъ въ борбата.

Нека добавя още че, за успѣха въ борбата съ кой да е вредителъ, е необходимо преди всичко добра подготовка на организация и най-много постоянно въ борбата.

За да се види какъ всестранно трѣбва да се подготви и организира всѣка една борба съ вредителитѣ, ще посоча като примѣръ борбата съ гжсеницитѣ на пеперудата „Монахиня“, *Lymantia monacha* въ Чехославия. Тази пеперуда, макаръ и да я има у насъ, не е позната като вредна. Въ Срѣдна Европа, обаче, особено въ Чехославия, тя прави голѣми опустошения на смърчовитѣ гори. И днесъ въ Чехославия има надъ 100 хиляди декари смърчова гора, унищожена отъ гжсеницитѣ на монахинята. Старитѣ срѣдства, които сж се препоръчвали за борба съ този неприятелъ, като: предпазителни прѣстени, събиране яйцата и пр. не сж могли да помогнатъ и пеперудата е вършила ежегодно своята разрушителна работа.

Едва напоследѣкъ отъ 3 години, съ увеждането на аероплана въ борбата съ вредителитѣ по културнитѣ растения, на монахинята се нанесе единъ чувствителенъ ударъ и днесъ става възможна вече една успѣшно водена борба съ монахинята. Тази еволюция въ борбата съ монахинята, и на борбата съ повечето неприятели по горитѣ и културнитѣ растения, изобщо, се дължи на професоръ Комарекъ, който всестранно е изучилъ живота на пеперудата и е далъ една правилна насока въ борбата съ гжсеницитѣ ѝ.

При тази борба сж комбинирани нѣколко методи. Преди всичко, приложенъ е биологичниятъ методъ, като за целта е използвана една *паразитна муха Tachina*, както и паразитнитѣ ципокрили ихнеумони.

Въ химическата борба е употребена главно вътрешната отрова *калциумъ арсенатъ* въ видъ на ситенъ прахъ, който съ помощта на аероплани се прѣска на широко по нападената гора.

Благодарение на добре подготвената и организирана борба, тази пеперуда е почти унищожена въ Чехославия и по този начинъ сж спасени стотици хиляди хектари смърчови гори отъ унищожаване.
