

**ВИДОВЕТЪ ОТЪ СЕМ. CERAMBYCIDAE (Col.)
ВЪ БЪЛГАРИЯ. II. (Lamiinae)**

По сборкитѣ на Царската ентомологична станция въ София
Отъ С. Кантарджиева-Минкова

**DIE ARTEN DER FAMILIE CERAMBYCIDAE (Col.)
IN BALGARIEN. II. (Lamiinae).**

Nach der Sammlungen der Königlichen Entomologischen Station in Sofia
Von S. Kantardjiewa-Minkowa

III. Подсем. Lamiinae

Родъ *Dorcadion* Dalm.

126. *D. aethiops*¹⁾ Scop. (=morio Fabr.). Срѣща се често по тревата. Познати находища: Варна, Бургасъ, Созополъ, Сливенъ, Хасково, Стара-Загора, Пещера, Срѣдна-Гора, Али-Ботушъ-пл., София, Драгалевци, Люлинъ-пл., Рила-пл., Лакатникъ и др. Общо разпространение: Срѣдна Европа.

127. *D. fulvum* Scop. — Много обикновенъ видъ. Срѣща се много често по тревата, кждето ларвитѣ гризятъ младитѣ коренчета и листа на растенията.

ab. nigripenne Fleisch. — Драгоманъ (1 екз. 9.IV. 1922 г. Кр. Ивановъ, det. Heyrovsky, 1930 г.). Общо разпространение на вида: Срѣдна Европа и Южна Русия.

128. *D. lugubre* Kt. — Кресненското дефиле (3 екзмп. Илчевъ и 1 екз. Папазовъ). Общо разпространение: Македония.

129. *D. Sturmii* Friv²⁾. — Ендемична форма за България.

¹⁾ Въ „Catalogus Coleopterorum regionis palaearcticae“ Winkler, 1929. Pars 10, стр. 1187, е съобщенъ вида *Dorcadion hybridum* Gang. съ находище България. Въ описанието, което L. Ganglbauer дава за този видъ (1883, стр. 441) има находище Balcan (което трѣбва да се счита за Балкански п въ).

²⁾ Въ „Catalogus Coleopterorum regionis palaearcticae“ A. Winkler, Pars 10, 1929 г. стр. 1188, е публикуванъ вида *D. Sturmii* Friv. съ разпространение „Македония и Турция“. Вида *D. Sturmii* Friv. е ендемиченъ за България и е описанъ отъ Jm. Frivaldsky, 1837 год., стр. 179, по екземпляри, намѣрени около „Пловдивъ и Карлово“. Съобщеното разпространение за вида „Македония и Турция“ въ Winkler'овия каталогъ се отнася за 1837 г., когато действително България се е включвала въ Турската империя, а не се отнася за 1929 г., когато е издаденъ споменатиятъ каталогъ. Същата поправка трѣбва да се направи и въ „Coleopterorum Catalogus“ W. Junk, Pars 73, год. 1922, стр. 38.

Срѣща се ограничено: — Пловдивъ, Карлово, Кричимъ, Бѣлово въ Родопи, Т.-Пазарджикъ, София и Конюва-планина.

130. *D. Krüperi* Gangl. — Битоля (1 екз. П. Дрънски).

Общо разпространение: Македония, Гърция, Олимпъ.

131. *D. septemlineatum* Waltl. — Търново (2 екз. Недѣлковъ). България (1 екз. безъ опредѣлено находище, det. Heyrovsky, 1934 г.). Текиръ-дагъ при Ганось (2 екз. 6.V. 1913 г. Бурешъ, det. Ramb.).

ab. apicale Thoms. — Търново (det. Heyrov.); Горна-Джумая (10 екз. Фененко, 1930 г.); Бадома (1 екз. Бурешъ, det. Heyrovsky). Общо разпространение на вида: Турция и Мала-Азия.

132. *D. condensatum* Küst. var. *punctipenne* Küst. — Куру-Дагъ при Кешанъ (2 екз. уловени отъ Бурешъ). Общо разпространение: Турция и Мала-Азия.

133. *D. Scopoli* Hbst. (= *lineatum* F.) — София, Мездра, Вратца (det. Heyrovsky); Хасковски-бани (съобщава Д. Йоакимовъ, 1904, стр. 34).

ab. convexicollis Küst. — Вратца (1 екз. det. Heyr.). Общо разпространение на вида: Южна Германия, Унгария, Кралщина, Сърбия.

134. *D. arenarium* Scop. — Срѣща се доста често: Бургасъ, Странджа-пл., Сливенъ, Ст.-Загора, Пазарджикъ, Срѣдна-гора, София, Конюва-пл., Елешница, Рила-пл., Витоша, Драгалевци, Германски м-ръ.

var. axillare Küst. — Срѣща се доста често: Бургасъ, Сливенъ, Пловдивъ, Бѣлово; Шипченски-Балканъ (Netolitzky, 1912 г., стр. 12); Свищовъ, Евксиноградъ, Горна-Орѣховица (det. Heyrov. 1934 г.); Общо разпространение на вида: Срѣдна Европа.

135. *D. tauricum* Waltl. (= *nigritarse* Kr.) — Владая, Германски м-ръ въ Лозенъ-пл., Странджа-пл., Търново, София, Ломъ, Казанлъкъ, Свищовъ, Вратца, Бургасъ (съобщава Нед. 1905 г., стр. 13). Общо разпространение: Южна Русия, Кримъ и Балкански п-въ.

136. *D. olympicum* Ggib. — Т.-Пазарджикъ (1 екз. Нед. det. Heyrovsky); Централни-Родопи, при с. Фотенъ (Дрънски 1924). Общо разпространение: Мала-Азия и Турция.

137. *D. lineatocollis* Kraatz — София. (1 ♀ и 1 ♂ екз. Чорб., det. Heyrovsky); Горна-Джумая (20 екз. Фененко); Кюстендилъ (1 ♂ екз.); Битолско (2 екз. П. Дрънски). Общо разпространение: Македония.

138. *D. pedestre* Pod (= *rufipes* Fabr.). — Най-обикновенъ видъ, разпространенъ твърде много въ България.

var. molitor Redt. — Странджа-пл., Малко-Търново, с. Кости (det. Heyrov.); Сливенъ, Търново, Хасково.

var. Gogium Thoms. — Срѣща се заедно съ първия. М.-Търново, Пловдивъ, Садово, София, Търново.

* *ab. ♀ austriacum* Gglb. — 1 екз. Търново (10.V. 1930 г., уловенъ отъ Д. Папазовъ, det. Heyrovsky, 1934 г.).

* *v. atritarsе* Pic. — 1 екз. с. Кюприя въ Странджа-пл. (25.V. 1931 г. Кр. Тулешковъ, det. Heyrovsky, 1934). Общо разпространение на вида: Срѣдна Европа.

139. *D. gallipolitanus* Thoms (= *suturaalba*, Desbr.). — Бѣласица (VII. 1916 г. Бур.); Текиръ-дагъ при Ганосъ, Бадома, Деде-Агачъ (det. Heyrov.). Общо разпространение: Турция, Гърция, Галиполи.

140. *D. equestre* Lachm. (= *cruciatum* Fabr.). — Сливенъ, с. Жеравна.

var. reclinatum Kr. — Драгоманъ, Банки.

var. niveoconjunctun Pic. — Драгоманско блато (1 екз. Иоак., det. Heyrov.).

var. Nogelli Fairm. — Драгоманско блато.

var. exclamationis Thoms. — Битоля, Кота 1248 м. в. (6 екз. П. Дрънски, det. Heyrov.). Общо разпространение на вида: Балкански п-въ и Мала-Азия.

141. *D. ljubetense* Breit. — вр. Руенъ, 2255 м. в. въ Осогова-пл. (1 екз. 13. VII. 1926 г. А. Дрънски). Разпространение: Албания.

142. *D. Bureši* Sterba. — с. Киречларъ, Ксанти (1 екз. 30. VII. 1915 г. Д. Илчевъ. *Tyrus*'а е запазенъ въ сбиркитѣ на Царската ентом. станция въ София).

143. *D. bilineatum*¹⁾ Germ. — Твърде обикновенъ видъ. Срѣща се навсѣкжде.

ab. unicolor Csiki. — Свищовъ (1 екз. Нед.), Пловдивъ (3 екз. Нед.). Общо разпространение на вида: Унгария, Седмиградско, Турция, Гърция, Корфу.

144. *Neodorcadion exornatus* Friv. — Сливенъ, Хасково, (Нед. 1905 г., стр. 13), Чирпанъ (1 екз. Нед.), Елефтерски м-ръ (1 екз. Бурешъ). Общо разпространение: Мала-Азия, Турция. Ориенталски елементъ.

145. *Neodorcadion balcanicum* Tourn. — Бургасъ (1 екз. det. Heyrovsky); Странджа-пл., Рѣзово (Дрънски 1930), Хасково. Общо разпространение: Мала-Азия, Турция. Ориенталски елементъ.

146. *Dorcadion Borisi* Heyrov. — Бѣласица (1 екз. VI. 1929 г. Pfefer—Cotypus.); Осогова-пл. вр. Руенъ 2253 м. в. (1 екз. Н. Радевъ, det. Heyrov. като subsp. nova).

* Означенитѣ съ звездичка видове сж нови за фауната на България.

¹⁾ А. Марковичъ, 1909 г. стр. 16, съобщава вида *D. fulginator* L. *var. vittigerum* F. и *var. atrum* Bach., разпространени навсѣкжде изъ Разградска околностъ. Между нашитѣ материали такъвъ не намѣрихъ. Видътъ се срѣща въ Южна Европа (Германия, Франция, Швейцария и Пирини). Н. Недѣлковъ, 1905 год. стр. 13, съобщава вида *D. decipiens* Germ. съ находище Лозенъ пл. Между нашитѣ материали такъвъ не намѣрихъ. Видътъ се срѣща въ Унгария и южна Русия.

Родъ *Dorcatypus* Thoms.

147. *D. tristis* L. — Прилича много на *Morimus funereus* Muls. — Отличава се по голѣмината си (15-19 мм.). Въ България сж известни малко находища: Витоша, Княжево, Люлинъ, София (Нед. 1905 стр. 11¹); Петричъ (съобщава Проф. Neugovskiy, 1931 г., стр. 83). Общо разпространение: Южна и Срѣдна Европа.

Родъ *Morimus* Serv.

148. *M. funereus* Muls. (= *tristis* Scop.) — Ларвата живѣе въ дѣнеритѣ на стари букови и други дървета. Въ България се срѣща много често, повечето въ планинскитѣ и гористи мѣстности. Общо разпространение: Южна и Срѣдна Европа.

Родъ *Lamia* Fabr.

149. *L. textor* L. — Ларвата живѣе въ дѣнеритѣ на стари върби и тополи. Познати находища сж: Сливенъ, Родопи — Чехльово (Дрѣнски 1926), Баня-Костенецъ, Бѣлово, Пазарджикъ, Срѣдна-гора, Витоша, София, Княжево, Бояна, Люлинъ пл., Германски манастиръ, Враждебна, Разградъ. Общо разпространение: Европа, Сибиръ.

Родъ *Monochamus* Guer.

150. *M. sortor* F. — Срѣща се често по иглолистни дървета. Познати находища: Стара-Загора, Централни-Родопи — Чепеларе (Дрѣнски 1924), Бѣлово, София; Русе — Образцовъ чифликъ (Ковачевъ, 1904-1905, стр. 9). Общо разпространение: Срѣдна Европа.

151. *M. sutor* L. — Ларвата живѣе въ стеблата на иглолистни дървета. Срѣща се заедно съ първия. Общо разпространение: Северна и Срѣдна Европа.

152. *M. galloprovincialis* Ol. — Ларвата живѣе въ стеблата на иглолистни дървета. Срѣща се по-рѣдко отъ първитѣ два вида. Познати находища: София (1 екз.); Стара-Загора (съобщава Нед. 1905 г., стр. 11). Общо разпространение: Южна и Срѣдна Европа.

Родъ *Mesosa* Latr. (= *Harpocnemia* Gem.)

153. *M. curculionoides* L. — Ларвата живѣе въ стеблата на дѣбови и брѣстови дървета. Родопи — Бѣлово, Кюстендилъ, София, Вратца; Разградъ (Марковичъ, 1909 г., стр. 16); Рила пл. (Neugovskiy, 1931 г., стр. 83). Общо разпространение: Европа.

¹) Н. Недѣлковъ въ „Пети приносъ къмъ ентомологичната фауна на България 1909, стр. 15, съобщава вида *Morimus orientalis* Reitt. съ находища: „Стара-Загора, Бургасъ, Варна, Турция, Румелия, Мала-Азия“. Между материалитѣ на Царската ент. станция такъвъ видъ не се намѣри.

154. *M. nebulosa* F. — Срѣща се по джбъ, букъ и то-пола. Родопи, Пазарджикъ, София, Кюстендилъ, Вратца, Варна, Разградъ; Шипченски балканъ (Netolitzky, 1912, стр. 11, го съобщава като *Haplocnemis nebulosa* F.). Общо разпространение: Срѣдна Европа.

Родъ *Anaesthetis* Muls.

155. *A. testacea* F. — Срѣща се по широколистни дървета, твърде рѣдко. Познати находища: Странджа пл. — Рѣзово (Дрѣнски 1931); Шипченски балканъ (Netolitzky, 1912 г., стр. 11); София (Иоак. 1904 г., стр. 33; Нед. 1905 г., стр. 11). Общо разпространение: Срѣдна и Южна Европа.

Родъ *Pogonocherus* Zett.

156. *P. hispidulus* Pill. — Срѣща се по иглолистни дървета. с. Турия — Казанлъшко; Рила пл. и Петричъ (съобщава проф. Негровsky, 1931 г., стр. 83). Общо разпространение: Северна и Срѣдна Европа.

157. *P. hispidus* L. (=dentatus Geoffr.). — Витоша (1 екз.), с. Клисура (Нед. 1905 г., стр. 14). Общо разпространение: Европа, Северна Африка.

158. *P. fasciculatus* Dej. — По иглолистни дървета. Родопи, Рила, Чамъ-Курия; Витоша, Станимака, Неврокопско. Общо разпространение: Северна и Срѣдна Европа.

Родъ *Calamobius* Guer.

159. *C. filum* Rossi (=gracilis Creutz.). — Ларвата живѣе въ житнитъ стебла. Познати находища: Бургасъ, Стралджа, Пазарджикъ (Нед. 1909, стр. 16); Стара-планина — Тодорини кукли (Нед. 1905, стр. 12); Разградъ (Марковичъ, 1909 г., стр. 16). Общо разпространение: Срѣдна и Южна Европа, срѣдиземноморска областъ.

Родъ *Acanthoderes* Serv.

160. *A. clavipes* Schrnk. (=varia F.). — Ларвата се срѣща по изсъхнали широколистни дървета, понѣкога по черешови и вишнови стебла. Въ България: Странджа-планина, Родопи — Бѣлово, София, Вратца, Ломъ, Разградъ. Общо разпространение на вида: Европа.

Родъ *Leiopus* Serv.

161. *L. nebulosus* L. — Срѣща се подъ кората на джбови и букови дървета. Познати находища сж: Родопи — вр. Белмекенъ, Люлинъ, София, Рила, Брѣзница; Петричъ (Неу-

rovsky) 1931 г., стр. 83); Шипченски балканъ (Netolitzky, 1912 г., стр. 10); Вратчански балканъ, Генишъ-ада—Варненско (Дрънски 1930).

* *ab. unifasciatus* Pic. — Генишъ-ада при Варна (1 екз. П. Дрънски), Люлинъ-планина (1 екз. С. Кант., det. Нейровsky, 1934 г.). Общо разпространение на вида: Европа.

* 162. *L. femoratus* Fairm. — с. Бродилово—Странджа-пл. (1 екз. уловенъ отъ Д. Илчевъ на 29. V. 1923 г.). Общо разпространение: Турция, Мала-Азия, Кавказъ.

Родъ *Acanthocinus* Guér.

163. *A. aedilis* L. — Срѣща се по боровитѣ дървета. Чамъ-Курия, София, Княжево, Конюва-пл.; Родопи (Нед. 1909, стр. 16). Общо разпространение: Европа, Сибирь.

* 163. *A. griseus* Fab. — Бѣласица (1 екз. VII. 1930 г. П. Дрънски); Али-Ботушъ-пл. (1 екз. VII. 1930 г. П. Дрънски, det. L. Нейров. 1934 г.). Общо разпространение: Северна и Срѣдна Европа.

Родъ *Exocentrus* Muls.

165. *E. adpersus* Muls. — Срѣща се по стеблото и клонкитѣ на брѣзата. Познати находища: с. Турия (Казанлъшко); с. Клисуре (Нед. 1905, стр. 15); Пиринъ-пл. (Нейровsky, 1931 г., стр. 83); София. Общо разпространение: Срѣдна и Южна Европа.

166. *E. lusitanus* L. (= *balteatus* Gyll.). — Бояна и водопада, Ловечъ, Глава-Панега, Разградъ (Марковичъ 1909 г., стр. 15). Общо разпространение: Европа.

167. *E. punctipennis*¹⁾ Muls. — Срѣща се по стари изсъхнали плетища и дървени клонки. Познати находища сж: Казанлъкъ; Шипченски б-нъ (Netolitzky, 1912 стр. 10); Али-Ботушъ (Нейров. 1931 стр. 83); Неврокопско (1 екз. Чорбаджиевъ). Общо разпространение: Срѣдна Европа.

Родъ *Agapanthia* Serv.

Видоветѣ отъ р. *Agapanthia* се срѣщатъ по ниски тревисти крѣстоцвѣтни и други растения, а ларвитѣ имъ живѣятъ въ стеблата и коренчетата имъ.

168. *A. Kirbyi* Cyll. (= *latipennis* Muls.). — Странджа-пл., Сливенъ, Родопи—Костенецъ-бана, Чамъ-Курия, Централенъ балканъ—Юмрукъ-чалъ, вр. Кутелка; Срѣдна-Гора; Петричъ (Нейровsky, 1931, стр. 84); Бѣласица (1 екз. Тулешковъ). Общо разпространение: Срѣдна и Южна Европа, Балкански п-въ, Мала-Азия.

¹⁾ Въ сбирката на графъ Amedé Aleon, съхранена въ Царския Музей, се намѣриха екземпляри отъ *Exocentrus signatus* Muls., съ находище Бѣлгария. *Signatus* Muls е varietet отъ вида *E. punctipennis* и се срѣща въ Турция.

169. *A. Dahli* Richler. — Бургасъ, Стара-Загора, Родопи — Чепеларе, Пловдивъ, Садово, Пещера, Бѣлово, София, Рила — Чамъ-Курия; Витоша, Срѣдна-Гора (Нед. 1905, стр. 12); Търново, Провадия. Общо разпространение: Срѣдна и Южна Европа.

170. *A. villosoviridescens* Dej. (= *lineatocollis* Don.). — Стара-Загора, Пловдивъ, Садово, Чирпанъ, Родопи — Бѣлово, Витоша, Рила, Кресненско дефиле, Петричъ (Неугов. 1931). Търново, Стара-Загора и др. Общо разпространение: Северна и Срѣдна Европа.

171. *A. Boeberi* Fisch. (= *synarae* Germ.). — Странджа-планина, с. Калово, Чирпанъ, Дупница, Рила-пл. (Иоак. 1899, стр. 59, съобщава вида подъ синонимъ *acutipennis* Muls. по Ganglb.). Кресна, Али-Ботушъ, Марино-поле, Петричъ (съобщава Неугов. 1931, стр. 83). Общо разпространение: Южна Европа.

172. *A. cardui* L. (= *suturalis* Fab.). — Разградъ (Марк. 1909, стр. 16); Бадом (2 екз. Бурешъ); Кресна (Неугов. 1931, стр. 83). Общо разпространение: Срѣдна и Южна Европа, Мала-Азия, Сирия.

173. *A. violacea* Fab. (= *cyanea* Hrbst., *micans* Füssly). — Срѣща се много често по цвѣтоветъ на растенията. Въ България почти навсѣкжде. Общо разпространение: Срѣдна и Южна Европа.

174. *A. leucaspis* Stev. — Бургасъ, Странджанско блато, Сливенъ, Стара-Загора, Хасково, Садово, Родопи, Бѣлово; Тръвна (Netolitzky, 1931, стр. 83). Общо разпространение: Срѣдна Европа, Южна Русия, Кавказъ, Сибиръ.

* 175. *A. osmanlis* Rche. — Основата на членчетата на антенитъ сж покрити съ бѣлезникави космици. Долната страна на гърдитъ отстрани е покрита съ бѣли космици. Голѣмина 14 мм. Находище: с. Рѣзово — Странджа пл. (1 екземпляръ, уловенъ отъ Д. Илчевъ, 17. VI. 1921 г., det. Neuгов. 1934). Общо разпространение: Турция, Мала-Азия.

Родъ *Saperda* F.

176. *S. carcharias* L. — Ларвата живѣе въ стеблото и корена на тополата, кждето причинява голѣми вреди на дървото. Познати находища: София (често по тополитъ въ Зоологическата градина); Врана, Родопи — Бѣлово, Сливенъ и др. Витоша (Неугов. 1931 г. стр. 83). Общо разпространение: цѣла Европа.

177. *S. populnea* L. — Родопи-Чепеларе, Костенецъ-бана, Люлинъ, Владая, София; Рила (Неугов. 1931, стр. 83); Ломъ (Недѣлковъ, 1905, стр. 12); Русе (Ковачевъ, 1904/905 г., стр. 10); Станимака (Иоакимовъ, 1904, стр. 33). Общо разпространение: Европа.

* 178. *S. quercus* Charp. — с. Василико — Странджа-планина (1 екз. 16.V. 1931 г. Тулешковъ). Общо разпространение: Гърция, Унгария.

179. *S. scalaris* L. — Срѣща се често по широколистнитѣ дървета. Бачковски м-рѣ въ Родопи, Стара-загора; Срѣдна-Гора и Вратца (Недѣлковъ, 1905, стр. 12); Шипченски балканъ (Netolizky, 1912, стр. 11); Рила, Кресненско-дефиле, Петричъ (Неуговскы, 1912, стр. 83); Разградъ (Марк. 1909, стр. 16)¹). Общо разпространение: Северна и Срѣдна Европа, Кавказъ и Сибиръ.

180. *S. octopunctata* Scop. (= *tremulae* Cyll.). — Костенецъ-баня, Бѣлово въ Родопи, София, Витоша; Горубляне (Иоак. 1904, стр. 34); Вратца; вр. Тодорини-кули въ Стара-планина (Нед. 1905, стр. 13). Общо разпространение: Северна и Срѣдна Европа.

Родъ *Oberea* Muls.

Видоветѣ отъ р. *Oberea* се срѣщатъ по тревисти растения и ниски храсти; ларвитѣ имъ живѣятъ въ вѣтрешността на стеблата и клонкитѣ.

181. *O. pedemontana* Chev. (= *melanura* Gredt.). — Свищовъ (1 екз. Недѣлковъ). Видътъ се срѣща въ Тиролъ, Пиемонтъ, Далмация.

182. *O. oculata* L. — Срѣща се често по младитѣ върбови издѣнки. Северна и Южна България. Общо разпространение: цѣла Европа.

183. *O. linearis* L. (= *limbata* Muls.). — Срѣща се често въ Северна и Южна България. Общо разпространение: цѣла Европа.

184. *O. erythrocephala*²) Schrk. — Ларвата живѣе въ коренитѣ на обикновената млѣчка — *Euphorbia*. Срѣща се често въ България. Общо разпространение: Срѣдна Европа.

Родъ *Stenostola* Muls.

185. *S. ferrea* Schr. (= *nigripes* Muls., *plumbea* Bon.). — Ларвитѣ живѣятъ въ изсъхналитѣ клонки на липа или нѣ-

¹) А. Марковичъ, 1909 г., стр. 16, съобщава още следнитѣ видове: 1. *Saperda perforata* Pall., отъ Разградъ. 2. *Saperda phoca* Fröhl., съ находище Разградъ. Видоветѣ сж разпространени въ Северна и Срѣдна Европа.

Проф. Л. Неуговскы, 1931 г., стр. 83, съобщава вида *Saperda punctata* L. съ находища: Кресна и Петричъ. Видътъ се срѣща въ Срѣдна и Южна Европа.

Ковачевъ, 1904/905, стр. 83, съобщава вида *Saperda flavescens*, съ находище с. Ишикларъ, Орѣхово, вѣроятно погрѣшно вмѣсто вида „*Phytoecia flavescens*“.

²) Д-р Л. Неуговскы, 1931, стр. 84, съобщава вида *Oberea erythrocephala* ab. *insidiosa* Muls. съ находища Кресна, Али-ботушъ, Петричъ, Марино-поле и Деле-агачъ. Видътъ се срѣща въ Далмация.

Д. Иоакимовъ, 1904, стр. 34, съобщава вида *Oberea euphorbiae* Germ. съ находище Хасковски бани. Разпространение: Италия, срѣдиземноморска областъ.

кои плодни дървета. Познати находища: Баня-Костенецъ (Родопи), София, Витоша, Бълово. Общо разпространение: Сръдна Европа.

Родъ *Oxylia* Muls.

186. *O. Duponscheli* Br. — Стралджанско блато при Карнобатъ; Петричъ (Неуговски, 1931, стр. 84). Общо разпространение: Гърция, Турция, Мала-Азия, Сирия.

Родъ *Pilemia* Fairm.

187. *P. tigrina* Muls. — София; Черепишки м-ръ (Нед. 1905 г., стр. 16). Общо разпространение: Южна Франция, Унгария, Седмиградско, Балкански п-въ, Мала-Азия.

188. *P. hirsutula* Fröl. — Станимака, Бачково (по Ramb.) Кресненско дефиле, Петричъ (съобщава Неуговски, 1931, стр. 84); Стара-загора. Общо разпространение: Южна Европа, Турция, Мала-Азия, Кавказъ.

Родъ *Phytoecia* Muls.

Ларвитъ живѣятъ въ стеблата на разни кръстоцвѣтни растения, а бръмбаритъ се срѣщатъ по листата имъ.

189. *Ph. (Musaria) Thoms. nigripes* Voet. (= *affinis* Harr.). — Чепеларе — Централни Родопи, Чирпанъ, Сръдна-гора, София, Витоша, Рила. Общо разпространение: Сръдна и Южна Европа.

190. *Ph. nigricornis* F. — Бургасъ, Бълово въ Родопитъ. *ab. solidaginis* Bach. — Бълово въ Родопитъ; Рила и Али-Ботушъ (съобщ. Неуговски, 1931, стр. 84). Общо разпространение на вида: Северна и Сръдна Европа.

191. *Ph. cylindrica* L. — с. Кюприя въ Странджа-планина, Стара-загора, Баня-Костенецъ, София; Кресна, Бачково, Търново, Рила пл. (Неугов. 1931, стр. 84). Общо разпространение: Европа и Мала-Азия.

192. *Ph. balcanica* Friv. (= *Saperda balcanica* Friv.). — Оригиналната диагноза, която дава Ем. Фривалдски, 1835, стр. 268, гласи: „*S. elongata, nigra, capite thoraceque fulvo tomentosis; pedibus flavo nigroque variis; elytris notabilins praestitis, olivaceis. Circa Sltvno unicum solum inventum est exemplar.* Въ „*Catalogus Coleopterorum*“ W. Junk, Pars 74, 1923 г., стр. 554, е даденъ вида *Ph. balcanica* Friv., съ разпространение „Турция“, което трѣбва да се корегира съ „България“.

193. *Ph. pustulata* Schr. (= *lineola* Fab.). — София, Витоша, Княжево, Люлинъ, Панчерево, Германски м-ръ въ Лозенъ пл.; Хасковски бани (Иоак. 1904, стр. 34). Общо разпространение: Сръдна и Южна Европа, Мала-Азия.

194. *Ph. virgula*¹⁾ Charp. (=punctum Mén.) — Ларвата живѣе въ стеблата на *Artemisia*, *Tanacetum* и др. Бургасъ, Стара-Загора, Хасково, Чирпанъ, Бѣлово, Т.-Пазарджикъ, София, Рила-пл., Кресненско дефиле и Али-Ботушъ-пл. (Heyrovsky, 1931, стр. 84), с. Садина — Разградско (Марковичъ, 1909, стр. 16); Евксиноградъ при Варна. Общо разпространение: Срѣдна и Южна Европа.

195. *Ph. icterica* Schall. (=ephippium Fab.) — Ларвата се срѣща въ корена и стеблото на моркова и пастернака. Познати находища сж: Бургасъ, Стара-Загора, Чирпанъ, София, Люлинъ, Самоковъ, Трѣвна, Рила и Ишикларъ (Heyrovsky, 1931, стр. 84); Разградъ (Марк. 1909, стр. 16). Общо разпространение: Срѣдна и Южна Европа, Кавказъ, Мала-Азия.

196. *Ph. coerulea* Scop. (=rufimana Schrk.) — Бургасъ, Странджа-пл., Стралджанско блато при Карнобатъ, Стара-Загора, София, Своге, Пазарджикъ (съобщава Нед., 1909, стр. 16). Витоша, Пловдивъ, Ишикларъ, Кресна (Heyrovsky, 1931, стр. 84). Трѣвна (Heyrovsky по Hilf., 1931, стр. 84). Общо разпространение: Срѣдна и Южна Европа.

197. *Ph. coerulescens* Scop. (=virescens Fab.) — Срѣща се много често върху *Echium*, *Gynoglossum* и др.

var. nigrita Ned. — София (Нед. 1905, стр. 12); Срѣдна-Гора (Нед. 1909, стр. 19, въ Архивъ).

ab. obscura Bris. — Кресненско дефиле (съобщава Heyr. 1931, стр. 84)²⁾.

Родъ *Tetrops* Steph.

198. *T. praeusta* L. — Ларвата живѣе въ слабитѣ и нѣжни клонки на джбъ, букъ, брѣстъ, брѣза, върба и чере-ша, а възрастната форма се срѣща често презъ пролѣтѣта по цвѣтоветѣ на овощнитѣ дървета, особено сливитѣ. Въ България се срѣща навсѣкжде. Общо разпространение: Европа, Сибиръ.

199. *T. Starcki* Chev. — Али-Ботушъ, VI. 1929 г., върху *Fraxinus ornus* (съобщава L. Heyrovsky, 1931, стр. 84, по екземпляри съхранени въ Museum Praga). Общо разпространение: Алпи, Унгария, Далмация.

Тукъ съобщавамъ и следнитѣ нови видове и форми за фауната на България, които, по систематиченъ редъ, би трѣбвало да бждатъ публикувани въ първата часть на работата

¹⁾ Fr. Netolitzky, 1912 г., стр. 11, съобщава вида *Phytoecia virgula var. cyclops*, съ находище Търново. Този var. се срѣща въ Испания.

²⁾ D. Heyrovsky, 1931, стр. 84, съобщава още и следнитѣ видове: 1. *Phytoecia praetextata* Stev. съ находище Ишикларъ (по Rambousek). 2. *Ph. uncinata* Redtb. съ находище Мъглишъ. 3. *Ph. vittipennis* Reiche съ находище Румелия, Сливенъ (по Rambousek). 4. *Ph. rufipes* Ol. — 1 повреденъ екз. отъ Бургасъ (det. Heyrov. 1934). Между материалитѣ на Царската Ентомологична станция тѣзи видове не можахъ да констатирамъ.

ми „Видоветъ отъ сем. Cerambycidae (Col.) въ България“ (Известия на Българското Ентомологично Дружество, Книга VII, 1932 г.), тъй като тѣ се намѣриха по-късно и бѣха изпратени за ревизия и опредѣление на чехскиятъ колеоптерологъ D-г L. Neugovský въ Прага, комуто тукъ изказвамъ своята благодарностъ. Между материалитѣ се указа и една нова форма за науката, именно: *Xylosteus Bartoni* ab. *Heyrovsky* Ob., описанието на която ще бѣде публикувано по-късно. Тази форма е описана отъ D-г Obenberger въ Прага по единъ екземпляръ, намѣренъ въ Чамъ-Курия, Рила-планина отъ П. Дрънски на 1. VIII. 1932 г.; *typus*'а е съхраненъ въ сбиркитѣ на Царската Ент. Станция въ София.

Новитѣ видове и форми за фауната на България сж следнитѣ: 1. *Rhagium bifasciatum* a. *unifasciatum* Muls. — 1 екз. отъ Пиринъ-пл. (14. VII. 1932 г. Тулешковъ). 2. *Acmaeops septentrionis* Thoms. — Парангалица, Горно-Джумайско, (1. VII. 1932 г. П. Дрънски). Общо разпространение: Алпитѣ и Северна Европа. 3. *Gaurotes virginea* a. *thalassina* Schr. — Рила-пл. Солено-дере (21. VII. 1931 г. П. Дрънски и 1 екз. Н. Недѣлковъ). Общо разпространение: Срѣдна Европа. 4. *Cortodera discolor* Frm. a. *differens* Pic. — Бургасъ (11. VII. 1910 г. Чорбаджиевъ). — Разпространение: Гърция и срѣдиземноморската областъ. 5. *Phymatodes testaceus* a. *analis* Redtb. — 1 екземпляръ отъ София (25. V. 1930 г., П. Чорбаджиевъ). 6. *Phymatodes puncticollis* Muls. — София (1 екз. намѣренъ по джбови отрѣзани стълбове, 18. IV. 1930 г., П. Чорбаджиевъ). Общо разпространение Унгария и Русия. 7. *Plagionotus detritus* ab. *Székelyi* Kap. — Костенецъ-баня — Родопи (1 екз. 3. VII. 1928 г., П. Дрънски). 8. *Isotomus speciosus* ab. *Ganglbaueri* Pic. — 1 екз. гара Левски, V. 1932 г.

Въ публикацията си: „Видоветѣ отъ сем. Cerambycidae (Col.) въ България. I. (Prioninae и Cerambycinae) 1932 год., стр. 81, съобщихъ че броя имъ е: 194 видове и 40 форми, или всичко 234 видове и форми. Понеже следъ тази публикация бѣха намѣрени още 8 нови видове и 10 форми, за които съобщавамъ по-горе, то общия брой на всички до сега намѣрени въ България Cerambycidae е: 202 видове и 50 форми, или всичко 252 видове и форми.

Списъкъ на литературата върху Cerambycidae въ България.

Иоакимовъ Д.: Приносъ къмъ фауната отъ насѣкоми на Рила планина. — Периодическо списание, кн. 59, стр. 758-778; кн. 60, стр. 858-884. София 1899.

Иоакимовъ Д.: Приносъ къмъ българската фауна на насѣкомитѣ — Insecta I. Coleoptera. — Сборникъ за Народни умотворения, наука и книжнина, кн. XX стр. 1-43. София 1904.

- Ковачевъ Василъ: Приносъ за проучване ентомологичната фауна на България. — Годишникъ на Русенската Държавна Мжжка Гимназия „Князь Борисъ“ за учебната 1904-905 г., стр. 3-12. Русе 1905.
- Марковичъ А.: Материали по насѣкомната фауна на Разградската околност. — Трудове на Бълг. Природоизпитателно Дружество, кн. II, стр. 220-252. София 1909.
- Марковичъ А.: Приносъ къмъ насѣкомната фауна на Разградската околност. — Сборникъ за Народни Умотворения, наука и книжнина, кн. XXV, стр. 1-20. София 1909.
- Недѣлковъ Н.: Нашата ентомологична фауна. — Архивъ на Министерството на Народното Просвѣщение год. I, кн. 3, стр. 83-135. София 1909.
- Недѣлковъ Н.: Пети приносъ къмъ ентомологичната фауна на България. — Сборникъ за Народни умотворения, наука и книжнина, кн. XXV, стр. 1-36. София 1905.
- Недѣлковъ Н.: Приносъ къмъ Ентомологичната фауна на България. — Периодическо списание, кн. LXVI стр. 1-36. София, 1905 г.).
- Netolitzky Fr. Eine Sammelreise nach Bulgarien. — Coleopterologische Rundschau. Bd. I, стр. 137-143, 156-168. Wien 1912.
- Heyrovsky Dr L.: Beitrag zur Kenntnis der bulgarischen Cerambyciden. — Mitteilungen aus den Königlichen naturwissenschaftlichen Instituten in Sofia—Bulgarien. Bd. IV, 1931, p. 78-86.
- Frivaldsky Im.: Közlesek a Balkany vidéken tett természetudományi utasról. 1837.
- Ganglbauer L.: Bestimmungs-Tabellen der europäischen Coleopteren; Cerambycidae. Bd. VII & VIII. Brünn 1881-83.
- Winkler A.: Catalogus Coleopterorum regionis palaearcticae. Pars 9—1924. Pars 10 1932. Wien
- Junk W.: Coleopterorum Catalogus. Cerambycidae. Prioninae. Pars 39 — 1912; Pars 52 — 1913.
- Junk W.: Coleopterorum Catalogus. Lamiinae. Pars 73 — 1922; Pars 74 — 1923. Berlin.

Zusammenfassung.

In meiner Arbeit „Die Arten der Familie Cerambycidae (Col.) in Bulgarien. I“ — (Prioninae und Cerambycinae), welche in den „Mitteilungen der bulgarischen Entomologischen Gesellschaft in Sofia“, Band VII, 1932, zum Abdruck gelangte, habe ich 125 Arten und 28 Formen der Familie Cerambycidae, welche in Bulgarien gefunden wurden, bekanntgegeben; darunter sind zwei für die Wissenschaft neue Formen, nämlich: 1. *Dorcadion Borisi* Heyr., Fundort: Belasitza-Gebirge, Höhe 1900 m., welche nach dem Namen Seiner Majstät Boris III, König von Bulgarien, benannt wurde. 2. *Xylosteus sponolae* Friv. ab. bul-

garicus Heyrov., Fundort: Witoscha-Gebirge, und folgende für die Fauna Bulgariens neue Arten und Formen: 1. *Tragosoma depressarium* L.; 2. *Asemum striatum* ab. *agreste* Fab.; 3. *Tetropium castaneum*, ab. *fulcratum* Fab.; 4. *Leptura rubra* ab. *maculiceps* Fabr.; 5. *Plagionotus arcuatus* L. ab. *Reichei* Thoms.; 6. *Plagionotus Bobelayi* Brille.; 7. *Plagionotus floralis* ab. *basicornis* Rtt.; 8. *Saperda quercus* Charp. und 9. *Phytoecia geniculata* Muls.

In der vorliegenden Arbeit gebe ich weitere 78 Arten und 22 Formen bekannt; darunter ist eine für die Wissenschaft neue Form, nämlich *Xylosteus Bartoni* ab. *Heyrovsky* Ob., Fundort: Tscham-Kuria im Rylagebirge, und folgende für die Fauna Bulgariens neue Arten und Formen: 1. *Rhagium bifasciatum* ab. *unifasciatum* Muls.; 2. *Acmaeops septentrionis* Thoms.; 3. *Gaurotes virginea* a. *thalassina* Schr.; 4. *Cortodera discolor* Frm. a. *differentis* Pic.; 5. *Phymatodes testaceus* a. *analis* Redtb. 6. *Phymatodes puncticollis* Muls.; 7. *Plagionotus detritus* ab. *Szekelyi* Kan.; und 8. *Isotomus speciosus* ab. *Ganglbaueri* Pic.
