

КРАТЪКЪ ПРИНОСЪ КЪМЪ ПРОУЧВАНЕ НА ВРЕДАТА ОТЪ ЖИТНАТА СТЕБЛЕНА МУХА, CHLOROPS TAENIOPUS MEIG.

отъ Асенъ В. Лазаровъ, София.

KURZER BEITRAG ZUR KENNTNIS DER SCHÄDLICHKEIT DER GELBEN HALMFLIEGE, CHLOROPS TAENIOPUS MEIG.

von Assen W. Lasaroff, Sofia

Житната стеблена муха, *Chlorops taeniopus* Meig. е широко разпространена у насъ. Нейното присъствие е, обаче, явно забележимо въ онѣзи части на страната, които се отличаватъ съ своя по-хладенъ и по-влажненъ климатъ. Такива сж напр.: Софийско, Фердинандско, Врачанско, Берковско, Ботевградско и др. Въ тѣзи мѣста мухата се наблюдава почти всѣка година въ по-голѣмъ размѣръ. Въ мѣстата съ рано засушаваща се пролѣтъ житната стеблена муха е по-рѣдка и тамъ тя се срѣща въ по-голѣмъ размѣръ въ години съ твърде влажни пролѣти.

Вѣроятно, поради честото срѣщане на *Chlorops taeniopus* и поради това, че въ много случаи процента на повреденитѣ житни растения, за смѣтка на които става развитието на това насѣкомо, е значителенъ, *Chlorops*-а се смѣта за единъ отъ голѣмитѣ вредители на житнитѣ растения, респ. на пшеницата и ечемика у насъ. Така напр., Дръновски (2) съобщава, че житната стеблена муха презъ 1915 г. е причинила въ Софийско повече отъ 10% загуби на зимната пшеница и 30% на пролѣтния ечемикъ; Чорбаджиевъ (6) — до 90% и 100% загуби на есеннитѣ посѣви (пшеницата) въ Фердинандско и Варненско презъ 1926 год.; Ботевъ (1) — до 50%—60% загуби на пшеницитѣ „Ное“ и „Ново-старозагорска“, въ Садово презъ 1925 г. и пр.

Въпрѣки наличността на тѣзи констатации, въпросътъ за вредата отъ *Chlorops taeniopus* и за неговото икономическо значение за нашата страна е откритъ, не само поради това, че тѣзи констатации сж много оскѣдни, но и за това, че тѣ не могатъ да се приематъ за мѣрка на причинената отъ насѣкомото действителна загуба, а сж само едно указание за неговото присъствие и деятельность. Че това наистина е така се вижда и отъ самитѣ съобщения. Въ тѣхъ не е посоченъ начина, по който е определена причинената отъ вредителя за-

губа и е много лесно да се разбере, че заключенията за загубитъ сж основани само върху процента на нападнатитъ и повредени растения. Не е трудно, обаче, да се схване, че въ случая ние боравимъ съ две различни величини, именно: процентъ на нападнатитъ и повредени растения, отъ една страна, и процентъ на причинената загуба, което трѣбва да се има винаги предъ видъ, за да не се изпада въ грѣшки.

Действителната загуба, която причинява известенъ вредителъ би могла да се установи само тогава, когато тя се опредѣли количествено, т. е. чрезъ разликата въ добива, която се явява вследствие въздействието на вредителя върху растението. Установи ли се причиняваната отъ дадения вредителъ загуба, ще може да се сжди: 1. за икономическото значение на сжщия; 2. за условията отъ които зависи неговата вредителностъ и 3. за съответнитъ мѣрки за борба, които следва да бждатъ взети срещу вредителя. Явно е, следователно, отъ какво голѣмо значение за нашата страна е проучването на вреднитъ насѣкоми въ това направление.

Ржководимъ отъ тѣзи схващания и разполагайки съ богатъ материалъ, опитахъ се да установя характера на повредата, причинявана отъ житната стеблена муха и влиянието на сжщата върху растежа и добива на пшеницата у насъ. Настоящото съобщение е резултатъ отъ проучванията ми върху пшеницата № 159, която получихъ отъ агронома фитопатологъ г. Ив. Ковачевски, на когото тукъ изказвамъ голѣма благодарностъ. Този сортъ пшеница бѣше засѣтъ презъ месецъ декемврий 1934 г. въ София върху една площъ отъ около единъ аръ. Прибирането на реколтата е направено къмъ края на м. юлий 1935 г.

Биология на житната стеблена муха

Макаръ че настоящето съобщение нѣма за предметъ биологията на житната стеблена муха, необходимо е да се разгледатъ най-важнитъ моменти отъ живота и развитието ѝ, които се намиратъ въ непосредствена връзка съ разглежданиятъ въпросъ.

Chlorops taeniopus въ Софийско има три поколѣния. Мухитъ отъ първото поколѣние летятъ отъ срѣдата на месецъ априль до къмъ срѣдата на м. май; тѣзи отъ второто поколѣние — отъ срѣдата на м. юний до края на м. юлий и тѣзи отъ третото поколѣние — отъ срѣдата м. септемврий до къмъ срѣдата на м. октомврий.

Отъ културнитъ растения, отъ ларватана житната стеблена муха най-много страдатъ пшеницата, ечемикътъ и по-рѣдко ръжътъ, които биватъ повреждани отъ ларвитъ на третото поколѣние на мухата (презъ есенъта) или отъ ларвитъ на първото поколѣние на сжщата (презъ пролѣтъта) и нѣкои

диворастящи *Gramineae*, които служат за гостоприемници било през есента (за ларвитъ на третото поколение), било през лътото (за ларвитъ на второто поколение). Последниятъ случай е по-рѣдкъ у насъ. Проученитъ отъ мене пшенични растения бѣха повредени отъ ларвитъ на първото поколение на мухата.

Яйцата биватъ снесани върху горнитъ листа на растението. Следъ излюпването младата ларва се отправя къмъ стеблото, въ което се вгризва. При нападение още отъ есента, когато растенията сж още твърде млади, вследствие на повредата стеблото не може да израстне и остава много низко и надебелено. Ако класътъ е оформенъ, което става презъ пролѣтътъ, какъвто е и нашиятъ случай, ларвата се вгризва въ основата на сжщия, отъ едната му страна, и следъ това продължава да се храни, като гризе нѣжнитъ тъкани на младото стебло и смуче прииждащитъ сокове, които служатъ да хранятъ класа. При презимуващото поколение вредата, която причиняватъ младитъ ларви до настѣпването на студовитъ е много слаба. Тя става чувствителна и забележима едва на следната пролѣтъ, заедно съ по-усиленото растене на ларвата. При храненето си ларвата (като правило само една ларва върху едно отдѣлно стебло) слиза надолу, като прави върху стеблото една доста неправилна браздичка. Тази браздичка започва обикновено отъ върха на стеблото, подъ самия класъ, и продължава надолу до най-горното колѣнце. По този начинъ браздичката остава ограничена само върху най-горното междувъзлие. Дължината на браздичката вариира обикновено съ дължината на най-горното междувъзлие, но въ болшинството случаи тя е по-къса отъ 10 см. Въ началото браздичката е по-тъсна и по-плитка, а къмъ своя край (успоредно съ нарастването на ларвата) тя се удълбочава и разширява, като засѣга и цѣвноснопочестата тъканъ на стеблото. Най-горното междувъзлие въ повечето стебла е прикривено, изгърбено и доста надебелено.

Продължителността на живота на ларвата е изобщо голѣма. Споредъ Дрѣновски (2), ларвитъ отъ първото поколение живѣятъ 6—7 седмици, тѣзи отъ второто поколение 5—6 седмици, а ларвитъ на презимуващото поколение до 6 месеца.

Въ резултатъ отъ дейтелността на ларвата на житната стеблена муха и настѣпилитъ измѣнения въ нападнатитъ житни растения, настѣпватъ затруднения и по отношение нормалното хранене на класа, респ. на зърната въ последния, поради което, споредъ описанитъ въ литературата случаи, нападнатитъ растения намаляватъ силно дохода, или последния може да бѣде сведенъ дори до нула.

Влияние на житната стеблена муха върху растежа на пшеница № 159 и върху добива на сжщата.

Житната стеблена муха не вреди еднакво на отдѣлнитѣ видове и сортове житни растения. Споредъ Sogaue (5), осилеститѣ и банатската пшеници сж се указали по-устойчиви. Fleischmann (4) е намѣрилъ, че намалението на дохода при нѣкои сортове пшеници е както следва: при van Hoesck — 23.7%, при Heines Kolben aus Landsberg a. W. — 3.0%, при Swalöfs Diamant — 6.1%, при Szekacs — 1.6%. Дрѣновски (2) съобщава, че пшеницата и ечемикътъ различно реагиратъ на ларвата на мухата. Ето защо необходимо е въ това отношение проучването на отдѣлнитѣ видове и сортове житни растения.

При пшеницата № 159 нападнатитѣ и повредени растения бѣха съ белези, каквито изобщо показватъ нападнатитѣ отъ *Chlorops taeniopus* житни растения. При преглеждане и проучване, обаче, на класоветѣ на много нападнати растения можа да се установи, че въ последнитѣ не сж настъпили нѣкои особени измѣнения, които да се отразятъ по сжщия начинъ и върху реколтата.

Проучването на материала се изрази въ следното: 1. опредѣляне % на повреденитѣ стебла, 2. установяване влиянието на насѣкомото върху развитието и растежа на стеблото и класътъ, 3. опредѣляне на добива при здравитѣ и повредени растения и качеството на зърното. За целта се направиха нѣкои измѣрвания, резултатитѣ отъ които сж дадени въ долнитѣ таблици

ТАБЛИЦА № 1 TABELLE

За броятъ на здравитѣ и повредени пшенични стебла
Zahl der gesunden und beschädigten Weizenhalme

Пшеница № 159 Wt. Weizen № 159	Брой на здравитѣ стебла Zahl der gesunden Halme	Брой на повреденитѣ стебла Zahl der beschädigten Halme	% на здравитѣ стебла % der gesunden Halme	% на повреденитѣ стебла % der beschädigten Halme
Прегледани всичко 3081 стебла Untersucht insgesamt 3081 Halme	1477	1604	48%	52%

Отъ горната таблица се вижда, че повечето отъ половината отъ стеблата на пшеницата сж били нападнати, което е указание и за по-силното размножаване на житната стеблена муха презъ 1935 год. въ София.

ТАБЛИЦА № 2 TABELLE

За размѣритъ на стеблата и отдѣлнитъ имъ части при здравитъ и повредени отъ житната стеблена муха пшенични растѣния.
Die Ausmasse der Halme und deren Theilen bei den gesunden und beschädigten Weizenpflanzen.

Пшеница № 159 Wt. Weizen № 159	Срѣдна дължина на стеблото Мителре Лѣжина дес Halmes cm.		Брой на възлитѣ Залл дер Кнотен		Брой на междувѣзлитата Залл дер Internodien			Дължина на междувѣзлитата Лѣжина дер Internodien cm.				Дължина на междувѣзлитата Лѣжина дер Internodien cm.				Забележка Anmerkung	Измѣрваната сж направени въруху 200 здрави и 200 повредени стебла Gemessen sind 200 gesunde und 200 beschädigte Halme				
	3	4	5	6	1	II	III	IV	1	II	III	IV	V	VI							
Здрави стебла Gesunde Halme	41	150	9	41	150	9	5.3	9.0	16.4	27	4	7.2	9.8	16.3	24	2.8	6.4	9.28	10.9	16.8	23.9
Повредени стебла Beschädigte Halme	34	160	6	34	160	6	5.8	8.9	16.2	11.8	4.4	7.6	10.0	16.7	9.5	3	7.5	8.6	9.7	15.9	8.5



Фиг. 1. Въ лѣво здраво растение, въ дѣсно — повредено такова.

Отъ даннитѣ на таблица втора се вижда, че по своитѣ срѣдни размѣри повреденитѣ стебла се отличаватъ отъ здравитѣ такива по общата си дължина и по дължината на най-горното междувъзлие. Докато при повреденитѣ растения общото скъсяване е около 22%, (фиг. 1), то скъсяването само на горното междувъзлие е 57—65%, въ сравнение съ дължината при здравитѣ стебла. Иначе по броя на възлитѣ и междувъзлията си, както и по отношение размѣритѣ на първитѣ три, респ. четири и петъ междувъзлия, не се установи съществена разлика. Следователно, скъсяването при повреденитѣ стебла става за смѣтка на най-горното междувъзлие. Скъсяването започва отъ момента когато ларвата започва своето хранене и горното междувъзлие въ това време се намира въ периодъ на усиленъ растежъ. Въ сжщиятъ моментъ долнитѣ междувъзлия сж били почти привършили своето развитие.

ТАБЛИЦА № 3 TABELLE

За дължината на класътъ, броятъ на зърната въ сжщия и абсолютното тегло на зърната. — Länge der Ähre, Zahl der Körner in der Ähre und Tausendkorngewicht der Körner

Пшеница № 159 Wt. Weizen № 159	Дължина на класа срѣдно въ см.	Брой на зърната въ класа	Абсолют- но тегло на зърната	Забележа
	Mittlere Länge der Ähre in cm	Zahl der Körner in der Ähre	Tausen- dkornge- wicht g.	Anmerkung
Здрави стебла Gesunde Halme	10·3	35·93	40·29	отъ 200 здрави и 200 повредени класове (класове отъ здрави и повредени растения)
Повредени стебла Beschädigte Halme	10·0	33·19	41·13	Nach Messung von 200 gesunde und 200 beschädigte Ähre



Фиг. 2. Въ лѣво класъ отъ нормално растение, въ дѣсно — отъ повредено. (Рис. Ю. Филчевъ.)

Отъ направенитѣ измѣрвания се вижда, че има едно малко скжсяване на класоветѣ отъ повреденитѣ стебла и една малка разлика въ броя на зърната, въ полза на класоветѣ отъ здравитѣ стебла, което въ % е 5.7% за дължината на класа и около 7.5% за броя на зърната. Що се отнася до размѣритѣ на отдѣлни класове и до броя на зърната въ сжщитѣ, наблюдаваха се доста голѣми различия. Важно обстоятелство за отбелязване е, че у единъ голѣмъ брой растения, въпрѣки силното повреждане на горното имъ междувъзлие, класоветѣ бѣха много по-добре развити, отколкото при свършено нормално развититѣ растения, фиг. 2 (касае се до срѣднитѣ размѣри на последнитѣ). Зърната отъ класоветѣ на повреденитѣ растения сж напълно нормално развити, фиг. 3.



Фиг. 3. Въ лѣво зърна отъ класъ на нормално растение, въ дѣсно — отъ повредено такова. Фот. Д-ръ Кр. Тулешковъ.

ТАБЛИЦА № 4 TABELLE

За добива отъ здравитѣ и повредени отъ ларвата на житната стеблена муха пшенични растения. — Der Korntrag der von der gelben Halmfliegenlarve beschädigten und gesunden Pflanzen.

Пшеница № 159 Wt. Weizen № 159	Брой на класоветѣ Zahl der Ähre	Получено зърно въ кгр. Korntrag in kgr.	Получено въ по-малко въ % отъ повреденитѣ % der Kornminde- rung bei den beschädigten Pflanzen	Забележка Anmerkung
Здрави стебла Gesunde Halme	1100	1·332	—	
Повредени стебла Beschädigte Halme	1100	1·312	1·49%	

Въ резултатъ на малкитѣ измѣнения при стеблото и класа на пшеницата № 159 отъ житната стеблена муха, естествено бѣше да се очаква, че и крайниятъ резултатъ, из-

разенъ въ получения добивъ, не ще бжде много различенъ. Това се потвърди и отъ даннитъ въ таблица № 4, отъ кждето се вижда, че намалението на добива при повреденитъ растения е много незначително.

Изобщо, може да се каже че, въпрѣки масовото нападение и повреждане на пшеницата № 159 презъ 1935 год. въ София отъ житната стеблена муха, загубата, която пшеницата е претърпѣла, е много малка. Този резултатъ е твърде важенъ и заслужава внимание, още повече, като се има предъ видъ, че по начина на живота си житната стеблена муха е такъвъ вредителъ, срещу който не могатъ да се приложатъ никакви прѣки мѣрки за борба и че последнитъ трѣбва да иматъ за основа пълното познаване на отношенията между житната стеблена муха и нападнатитъ растения, въ връзка съ условията, въ които се развиватъ тия два организма. Специално върху причинитъ за малкитъ загуби при пшеница № 159 при нашия случай, азъ предполагамъ, че това се дължи: 1. на особеноститъ на самия сортъ (имамъ предъ видъ по-усиленъ растежъ и по-здрави тъкани) и 2. на обстоятелството, че растенията сж били нападнати късно, което може да се заключи и отъ размѣритъ на стеблата дадени въ таблица № 2.

Отъ наблюденията ми върху отдѣлни, силно развити класове отъ нападнати и повредени растения, азъ допускамъ дори, че при тѣхъ нараняването на стеблото не само не е повлияло отрицателно върху класа, но обратно: то е имало характеръ на бавно дразнене на цѣлото растение, въ резултатъ на което е предизвикано едно по-обилно прирѣждане на хранителни материи къмъ класа.

Заключение.

Отъ наблюденията и измѣрванията върху пшеница № 159 и житната стеблена муха презъ 1935 год. въ София могатъ да се направятъ следнитъ заключения.

1. Пшеницата № 159 се напада отъ *Chlorops taeniorus* Meig. Процентътъ на повреденитъ стебла при сжщата достига до 52%.

2. Загубата, причинена отъ *Chlorops taeniorus* върху сжщата пшеница презъ сжщото време, е много малка. Въ процентъ повреденитъ растения сж дали само 1.49% по-малко по тегло зърно.

3. Полученитъ различни стойности за % на нападнатитъ растения и % на причинената загуба показватъ, че тѣзи две величини не бива да се смѣсватъ и уеднаквяватъ.

4. Абсолютното тегло на зърното при повреденитъ растения е непромѣнено.

5. Поради това, че резултатитъ отъ направеното проучване не се сходятъ напълно съ даннитъ отъ литературата, желателно е проучването да се продължи съ огледъ и на други видове и сортове житни растения и други условия.

Използувана литература.

1. Ботевъ, С.: Стеблената муха (*Chlorops taeniopus* Mg.) сп. Земледѣлие, год. XXVIII, 1925, кн. 8.
2. Дръновски, Ал. К.: *Chlorops taeniopus* Meig. (Dipt.) Житната стеблена муха, наанасянитъ поврѣди и борбата съ нея въ Софийско. Архивъ на МЗ. Д. И. Т. II., 1921 г.
3. Дрънски, П.: Болести и неприятели на житнитъ растения въ България. — Издание на Министерството на Земледѣлието и държ. имоти. София 1930. Стр. 26—27.
4. Fleischmann, P.: Wirkungen des Halmfliegenbefalles bei verschiedenen Sommerweizensorten. Fortschr. d. Landw. 1931, S. 193.
5. Sogaue, P.: Handbuch der Pflanzenkrankheiten. Fünfter Band, II, Teil, 1928.
6. Чорбаджиевъ, П.: Неприятелитъ на културнитъ растения въ България презъ 1923 година. Сведения по земледѣлието, г. IX, кн. 3 и 4, 1928.

Zusammenfassung

Im Jahre 1935, in Sofia, machte der Verfasser Untersuchungen über das Ausmass des Schadens, der auf dem Winterweizen № 159 durch die gelbe Halmfliege, *Chlorops taeniopus*, verursacht wird. Der Winterweizen № 159 ist in Bulgarien durch die Kreuzung des „Noeweizen“ und einer heimischen Weizensorte erzielt worden.

Von den gemachten Beobachtungen und Ausmessungen, ist der Verfasser zu folgenden Schlüssen gekommen:

1. Der Winterweizen № 159 wird von der gelben Halmfliege angegriffen in derselben Weise wie auch die anderen Weizensorten. Das Prozent der angegriffenen und beschädigten Halme von dieser Fliegenlarve stieg bis zu 52% (Tabelle № 1).

2. Der tatsächliche Schaden verursacht durch den *Chlorops taeniopus* ist aber viel kleiner. Prozentual haben die beschädigten Pflanzen, im Vergleich zu den gesunden, nur etwa 1.49% weniger Korn an Gewicht gegeben (Tabelle № 4).

3. Das Prozent der angegriffenen und beschädigten Pflanzen darf nicht verwechselt werden mit dem Prozent des tatsächlichen Insektenverlustes. Die vorgenommenen Ausmessungen haben es bewiesen dass diese zwei verschiedene Werten sind und zwar ist das Prozent der angegriffenen und beschädigten Halme 52, dieses des tatsächlichen Verlustes an Korn nur 1.49%.

4. Das Tausendkorngewicht bei beschädigten Pflanzen ist fast gleich diesem der ganz gesunden (Tabelle № 3).

5. Am wenigsten sind die Veränderungen des Halmes selbst bemerkbar, und zwar, sind die beschädigten Halme, im Vergleich zu den gesunden, im allgemeinen um 22% kürzer. Die Verkürzung der obersten Halmglieder, verglichen mit der Länge derselben bei den gesunden Pflanzen, beträgt 57—65%. Sonst unterscheiden sich die gesunden und beschädigten Pflanzen bezüglich der Zahl der Halmknoten und der Halmglieder nicht wesentlich (Tabelle № 2).