

ТАБЛИЦИ ЗА ОПРЕДЪЛЕНИЕ ВИДОВЕТЪ ОТЪ СЕМ.
CERAMBYCIDAE (Coleopt.) ВЪ БЪЛГАРИЯ. III.
(Prioninae и Cerambycinae)

Отъ С. Кантарджиева-Минкова

BESTIMMUNGS-TABELLEN DER ARTEN VON FAM. CERAM-
BYCIDAE (Coleopt.) IN BULGARIEN. III.
(Prioninae und Cerambycinae)

Von S. Kantardjiewa-Minkowa

Въ книга VII на „Известия на Българското Ентомологично Дружество“, 1932 г. публикувахъ една статия върху: „Видоветъ отъ сем. Cerambycidae въ България“ I часть, въ която съобщихъ подробното разпространение и находищата на 125 видове и форми отъ това семейство. Въ книга VIII на същитъ известия публикувахъ втора статия върху: „Видоветъ отъ сем. Cerambycidae въ България“ II часть, въ която съобщихъ разпространението и находищата на още 127 видове и форми отъ същото семейство.

Тъй като къмъ сем. Cerambycidae спадатъ много твърдокрили, вредни за горитъ и културнитъ растения, счетохъ за умѣстно да съставя опредѣлителни таблици за родоветъ, видоветъ и вариететитъ на всички досега намѣрени въ България Cerambycidae, за да може всѣки желающъ, по нѣколко главни и характерни за бръмбара белези, да намѣри и опредѣли името на вредителя. Въ настоящата си статия давамъ опредѣлителни таблици на следнитъ 2 подсемейства: Prioninae и Cerambycinae, а на III-тото подс. Lamiinae, опредѣлителнитъ таблици ще се печататъ допълнително.

Семейство Cerambycidae се раздѣля на 3 подсемейства:

Таблица за опредѣление на подсемействата:

1. Антенитъ нѣматъ космици (фиг. 1-а). Бедренитъ главички (кокситъ) на преднитъ крака сж напрѣчно удължени (фиг. 2-а). Главата задъ очитъ не е стѣснена шиесподобно. Гръдниятъ щитъ има заострени странични ржбове (често и назбени) подс. *Prioninae*
- Антенитъ сж покрити съ множество космици или сж послабо окосмени (фиг. 1-б). Бедренитъ главички (кокситъ) на преднитъ крака сж топчести или конически (фиг. 2-б). Гръдниятъ щитъ има закржглени странични ржбове, които често въ срѣдата иматъ по единъ бодилъ 2

2. Пищялитъ на преднитъ крака отъ вътрешна страна иматъ по една полегата налължна бразда (фиг. 3). Последното членче на устнитъ и челюстнитъ пипалца (taster'итъ) е изострено на върха (фиг. 4-а). Антенитъ сж втикнати въ извивката на бѣбрековиднитъ очи. Главата отпредъ пада вертикално надолу подс. *Lamiinae*
- Пищялитъ на преднитъ крака отъ вътрешна страна нѣматъ никаква бразда. Последното членче на пипалцата (устни и челюсти) е затѣпено на върха (фиг. 4-б). Антенитъ сж разположени близо, предъ или отстрани на извивката на очитъ. Главата е наведена напредъ и надолу подс. *Cerambycinae*



Фиг. 1.




Фиг. 2.



Фиг. 3.



Фиг. 4.



Фиг. 5.



Фиг. 6.

I подсем. *Prioninae*

Тукъ спадатъ голѣми черни или кафяви бръмбари (отъ 15—50 мм.) съ широко и плоско тѣло.


Таблица за опредѣление на родоветъ отъ подсем. *Prioninae*

1. Страничитъ ржбове на грѣдния щитъ (= prothorax'a) сж силно изострени, често иматъ по нѣколко зѣбци или бодли. Елиплеурума (страничния и обѣрнатъ надолу ржбъ на елитритъ) е доста тѣсенъ, напредъ се разширява и докосва раменния връхъ (фиг. 5-а) 2
- Страничитъ ржбове на грѣдния щитъ (= prothorax'a) сж закрѣглени (затѣпени), съ или безъ зѣбци и бодли.

- Епиплеурума (страничния и обърнатъ надолу ржбъ на елитритъ) е много тѣсенъ, напредъ не се разширява и не докосва раменния връхъ (фиг. 5-б) 3
2. Антенитъ сж кжси, дебели и трионовидно назжбени (по-силно назжбени при ♂♂ индивиди, по-слабо — при ♀♀ индивиди). Тѣ сж съставени отъ 12 членчета, които при ♂♂ индивиди сж ясно видими, а при ♀♀ индивиди последнитъ две сж сраснали въ едно, така че се виждатъ 11 членчета. Страничнитъ ржбове на гръдния щитъ иматъ по 3 остри бодили, обърнати назадъ (фиг. 6-а) родъ *Prionus* Geoffr.
- Антенитъ сж по-дълги, тънки и нишковидни. Тѣ сж съставени отъ 11 членчета (при ♂ и ♀ индивиди); страничнитъ ржбове на гръдния щитъ сж назжбени (ф. 6-б) 4



Фиг. 7.



Фиг. 8.

3. Страничнитъ ржбове на гръдния щитъ сж закржглени и само въ срѣдата имъ се намира по единъ остъръ бодилъ. Гръдниятъ щитъ отгоре и отстрани, както и гърдитъ отдолу сж покрити съ множество нѣжни, меки, изправени нагоре жълто-кафяви космици. Елитритъ сж мазно лъскави, неправилно пунктирани и не много ясно надлъжно набраздени (фиг. 7) родъ *Tragosoma* Serv.
- Страничнитъ ржбове на гръдния щитъ сж закржглени и обърнати надолу — въ срѣдата нѣматъ бодилъ. Формата на гръдния щитъ е коническа, заднитъ му жгли сж слабо източени назадъ, отгоре е покритъ съ ниски, по-


- легати, много гъсти, сиво-жълти космици. Антенитѣ сж дълги и озърнени, при ♂♂ индивиди отъ вжтрешна страна иматъ множество ситни бодлици, при ♀♀ — нѣматъ бодлици (фиг. 8) родъ *Megopsis* Serv.
4. Страничитѣ ржбове на гръдния щитъ сж финно назжбени (при ♂♂ индивиди) или ситно напилени (при ♀♀ инд.), а малко задъ срѣдата си иматъ по единъ обърнатъ назадъ бодилъ. Гръдния щитъ е много по-широкъ, отколкото дългъ), при ♂♂ индивиди отгоре е ситно и гжсто пунктиранъ съ 2 по-голѣми трижгълни, гладки и 1—2 по-малки голи полета, а при ♀♀ индивиди е неправилно и грубо набръчканъ (фиг. 9) родъ *Ergates* Serv.
- Страничитѣ ржбове на гръдния щитъ иматъ по 10—12 нееднакви, ситни и остри бодлици, а задъ срѣдата иматъ по единъ по-голѣмъ бодилъ или зжбъ. Гръдниятъ щитъ въ срѣдата е лъскавъ и оскждно пунктиранъ, къмъ странитѣ е по-грубо и неправилно пунктиранъ (фиг. 10) родъ *Rhesus* Motsch.



Фиг. 9.



Фиг. 10.



Фиг. 11.

Родъ *Rhesus* Motsch. — Единственъ европейски видъ *Rh. serricollis* Motsch. — Голѣмина 48—50 мм. Тѣлото е голѣмо, плоско, тъмно-кафяво, елитритѣ къмъ върха по-свѣтло кафяви, съ мазна лъскавина (фиг. 10).

Родъ *Megopsis* Serv. — Единственъ европейски видъ *M. scabricornis* Scop. — Голѣмина 40—50 мм. Тѣлото е ржжидво-кафяво, покрито съ ниски, сиво-жълти космици. Елитритѣ сж ситно озърнени, отгоре иматъ по две или повече надлъжно-изпъкнали ребра.

Родъ *Ergates* Serv. — Единственъ европейски видъ *E. faber* L. — Голѣмина 40—45 мм. Тѣлото е тъмно-кафяво, елитритѣ сж по-свѣтло кафяви.

Родъ *Prionus* F. — Въ България се срещат следните два вида:

1. Антенитъ при ♂♂ индивиди сж 12-членести, силно гребеновидно разширени, при ♀♀ сж 11-членести (последното членче е съставено отъ две сраснали); последните 3—4 членчета на антенитъ сж доста грубо надлъжно набраздени. Елитритъ сж много гъсто, кожовидно набръчкани, съ матова лъскавина, отгоре иматъ по 3 надлъжни, слабо изпъкнали, но ясно видими ребра; тълото е черно-кафяво, или по-свѣтло кафяво. Дъл. 24—40 мм. *coriarius* L.
2. Антенитъ и при двата пола сж 12-членести, последните 3—4 членчета сж финно и слабо надлъжно набраздени. Елитритъ сж слабо, кожовидно набръчкани, съ мазна лъскавина и съ много слабо видими изпъкнали ребра. Последното коремно членче при ♀♀ индивиди е източено силно назадъ. Дъл. 30—40 мм. *besicanus* Fairm.

Родъ *Tragosoma* Serv. съ вида *T. depsarium* L. — Тълото е жълто-кафяво, понѣкога е по-тъмно кафяво. Гръдния щитъ и гърдичкитъ отдолу сж покрити съ гъсти, жълтеникаво-кафяви, меки космици. Страничните ръбове на гръдния щитъ сж закръглени, въ срѣдата си иматъ по единъ тънъкъ, остъръ бодилъ. Срѣдниятъ шевъ между елитритъ назадъ се удължава и завършва съ единъ остъръ бодилъ. Дъл. 25—30 мм. (фиг. 7).

II подсемейство Cerambycinae

Раздѣля се на две племена: *Cerambycini* и *Lepturini*:

1. Ябълкитъ на бедрата (бедренитъ главички или кокситъ) на преднитъ крака сж коническо изпъкнали и приближени една до друга. Главата задъ очитъ е силно или по-слабо шиевидно стѣснена. Елитритъ назадъ и къмъ върха се стѣсняватъ доста *Lepturini*
2. Ябълкитъ на бедрата (бедренитъ главички) на преднитъ крака сж кръгли, топчесто изпъкнали, по рѣдко сж слабо конически. Главата задъ очитъ не се стѣснява шиеподобно (много рѣдко е слабо стѣснена). Елитритъ сж паралелни, понѣкога назадъ слабо се стѣсняватъ. Очитъ сж бѣбрековидни *Cerambycini*

Племя Cerambycini

Таблица за определяне родовете отъ племе Cerambycini

1. Тълото е много изпъкнало, почти цилиндрично, гръдния щитъ е топчестъ, съ силно закръглени страни. Антенитъ сж къси, колкото главата и гръдния щитъ заедно, по

- форма сж верижковидни. Тѣлото е черно, елитритѣ отгоре иматъ по 2 надлъжни, изпъкнали ребра . р. *Spondylis* F.
- Тѣлото не е такова 2
2. Елитритѣ сж много кжси. Бедрата на краката къмъ върха сж силно надебелени 3
- Елитритѣ не сж кжси, или малко по-кжси отъ коремчето 4
3. Дължината на елитритѣ не достига дори до основата на III-ия чифтѣ крака. Долнитѣ ципести криле едва покриватъ цѣлото коремче, или сж по-кжси отъ него. Антенитѣ сж по-кжси отъ дължината на тѣлото. Дъл. 19—32 мм. р. *Necydalis* L.
- Елитритѣ достигатъ, а понѣкога и надминаватъ основата на III-ия чифтѣ крака. Долнитѣ ципести криле сж дълги колкото коремчето, понѣкога сж доста по-дълги. Антенитѣ сж $1\frac{1}{2}$ до 2 пжти по-дълги отъ цѣлото тѣло. Малки индивиди. Голѣмина 8—12 мм. р. *Molorchus* F.
4. Ставнитѣ трапчинки на преднитѣ крака назадъ сж напълно затворени (фиг. 11-а). Бедрата на краката къмъ върха сж въртеновидно надебелени 5
- Ставнитѣ трапчинки на преднитѣ крака назадъ не сж напълно затворени (фиг. 11-б). 8
5. Елитритѣ назадъ поединично се стѣсняватъ и оставатъ отворени или зѣещи на върха. Тѣ сж малко скжсени. Гръдниятъ щитѣ отпредъ и отзадъ е стѣсненъ, отгоре има 2 или 3 гладки, изпъкнали мѣста. Антенитѣ сж жълти р. *Stenopterus* Steph.
- Елитритѣ назадъ слабо се стѣсняватъ, но не сж отворени, нито зѣещи на върха 6
6. Очитѣ сж грубо фацетирани. Елитритѣ сж жълто-кафяви р. *Obrium* Curt.
- Очитѣ сж финно фацетирани. Елитритѣ сж металическо синьо или по-тъмно бронзово оцвѣтени 7
7. Гръдниятъ щитѣ е червено-кафявъ (много рѣдко черенъ), елитритѣ сж сини. Антенитѣ, съ изключение на основното членче, сж тъмно-кафяви р. *Cartallum* Serv.
- Гръдниятъ щитѣ и елитритѣ сж еднакво оцвѣтени: синьо, синьо-зелено или тъмно-бронзово съ металенъ блѣсъкъ:
- а. Горната страна е сиво-зелена или бронзова. Антеннитѣ членчета, бедрата и пищялитѣ сж отчасти червеникави. Елитритѣ отъ рамото до върха иматъ изпъкнала странична надлъжна линия р. *Deilus* Serv.
- б. Горната страна на тѣлото е синя до синьо-зелена или черна съ металенъ блѣсъкъ; долната страна на тѣлото и краката сж металическо зелени, понѣкога основата на бедрата и коремчето сж жълти р. *Callimus* Muls.
8. Ставнитѣ трапчинки на преднитѣ крака настрани сж жглесто удължени (фиг. 12а) 19

- Ставните трапчинки на предните крака настрани сж за-
творени или удължени въ тѣсенъ израстъкъ или цѣпна-
тина (фиг. 12б, на стр. 179) 9
- 9. Очитѣ сж финно фацетирани 10
- Очитѣ сж по грубо фацетирани 17
- 10. Гръдниятъ щитъ е силно изпъкналъ, странично е закръг-
ленъ, безъ жбци или бодли. Антенитѣ сж по-къси отъ
дължината на цѣлото тѣло 11
- Гръдниятъ щитъ странично има по единъ бодилъ или жбъ.
Антенитѣ при ♂♂ сж по-дълги отъ цѣлото тѣло . . 16
- 11. Първото (основното) членче на стъпалата на заднитѣ
крака е много по-дълго отъ следващитѣ две заедно
(фиг. 13а, стр. 179) 12
- Първото (основното) членче на стъпалата на заднитѣ крака
е малко по-дълго отъ следващитѣ две заедно (фиг. 13б).
Тѣлото е черно, основата на елитритѣ е червено-кафява
(по-рѣдко черна), отгоре минаватъ финни, космести, бѣли
ивици р. *Anaglyptus* Muls.
- 12. Главата отпредъ между основата на антенитѣ има 2 къси,
изпъкнали, надлъжни ребра р. *Xylotrechus* Chev.
- Главата отпредъ нѣма изпъкнали надлъжни ребра . . 13
- 13. Гръдниятъ щитъ е по-широкъ, отколкото дългъ, или е
почти еднакво широкъ и дългъ 14
- Гръдниятъ щитъ е по-дългъ, отколкото широкъ . . 15
- 14. Гръдниятъ щитъ странично е много изпъкналъ, тѣлото е
грубо и едро. Елитритѣ сж покрити съ широки жълти
ивици отъ космици р. *Plagionotus* Muls.
- Гръдниятъ щитъ е по-слабо изпъкналъ, не много широкъ,
понѣкога е малко по-дългъ, отколкото широкъ. Тѣлото
е по-финно и удължено. Елитритѣ иматъ тѣсни и финно
очертани напрѣчни жълти ивици отъ космици. р. *Clytus* Leich.
- 15. Деветото членче на антенитѣ е толкова дълго, колкото е
четвъртото. Гръдниятъ щитъ има 3 бѣли точки или петна.
Голѣмина 13—18 мм. р. *Isotomus* Muls.
- Деветото членче на антенитѣ е по-късо отъ IV-тото. Гръд-
ниятъ щитъ нѣма бѣли точки и петна. Голѣмина 6—15 мм.
. р. *Chlorophorus* Chev.
- 16. Елитритѣ сж металическо зелени, сини, виолетни или брон-
зови, съ металенъ блѣсъкъ р. *Aromia* Serv.
- Елитритѣ сж матово-червени или жълти, съ черни петна
или знаци р. *Purpuricen* Fisch.
- 17. Prosternum'а на преднегърда къмъ върха се разширява.
Първитѣ 5 членчета на антенитѣ къмъ върха сж възло-
видно надебелени, отъ 5-тото членче нагоре сж плоски
и странично ставатъ остроръбести. Антенитѣ при ♂♂ ин-
дивиди сж 2 пѣти по-дълги отъ тѣлото. Бедрата на кра-
ката сж дълги, не сж бухалковидно разширени. Гръдниятъ

- щитъ е много грубо скулптиранъ. Голѣми индивиди (20 мм. — 53 мм.) р. *Cerambyx* L.
- Prosternum'a на преднегърда къмъ върха не е разширенъ. Антеннитѣ членчета сж еднообразно закржглени и гладки. Бедрата на краката къмъ върха сж бухалковидно разширени. Малки индивиди 18
18. Последното членче на челюстнитѣ пипалца е малко, и е малко по-дълго отъ предпоследното членче. Малки индивиди — 4—6 мм. р. *Gracilia* Serv.
- Последното членче на челюстнитѣ пипала е голѣмо, 3 пѣти по-дълго, отколкото е предпоследното членче. По-голѣми индивиди р. *Axinopalpis* Dup.
19. Очитѣ сж финно фацетирани 20
- Очитѣ сж грубо фацетирани 26
20. Гръдниятъ щитъ отъ дветѣ страни има по едно рогче. Членчетата на антенитѣ отъ III-тото нагоре на върха си носятъ по едно снопче гжсти, тъмни космици. р. *Rosalia* Serv.
- Гръдниятъ щитъ странично нѣма рогче. Антеннитѣ членчета на върха си нѣматъ снопчета отъ космици 21
21. Бедрата на краката къмъ върха сж силно бухалковидно разширени 22
- Бедрата на краката къмъ върха сж слабо надебелени . 25
2. III-тото антенно членче е нѣколко пѣти по-дълго отъ II-то . 23
- III-тото антенно членче е само 2 пѣти по-дълго отъ второто. Членчетата на антенитѣ на върха си сж възловидно разширени р. *Tetropium* Kirby.
23. Prosternum'a на преднегърда на върха е широкъ и дветѣ бедрени главички на преднитѣ крака сж раздалечени доста една отъ друга (фиг. 14а, на стр. 179). III-тото антенно членче е повече отъ 2 пѣти по дълго отъ IV-тото р. *Hylotrupes* Serv.
- Prosternum'a на преднегърда на върха си не е много широкъ (фиг. 14б, на стр. 179). III-тото антенно членче е по-дълго отъ V-тото р. *Ropalopus* Muls.
- Prosternum'a на преднегърда е много тѣсенъ и се вижда само като малко, тѣсно клинче, което дѣли бедренитѣ главички на преднитѣ крака (фиг. 14в, на стр. 179) . . . 24
24. Странитѣ на гръдния щитъ сж жглесто разширени, горната страна е много грапаво и грубо пунктирана; гръдниятъ щитъ покритъ съ гжсти, ниски, червени космици р. *Pyrrhidium* Fairm.
- Странитѣ на гръдния щитъ сж закржглени. Гръдниятъ щитъ е много грубо и зърнесто пунктиранъ, елитритѣ сжщо грубо пунктирани. Горната страна е металическо синя или зелена р. *Callidium* F.
- Странитѣ на гръдния щитъ сж закржглени. Гръдния щитъ е много финно и гжсто, понѣкога по-рѣдко пунктиранъ, често има гладки, изпъкнали мѣста. Елитритѣ сж дълги,


- паралелни, горната страна е много финно пунктирана .
 р. *Phymatodes* Muls.
 25. Антенитѣ сж дълги колкото половината отъ дължината на тѣлото, или сж по-къси. Тѣлото е слабо изпъкнало, гръдниятъ щитъ е по-широкъ, отколкото е дълъгъ, елитритѣ иматъ надлъжни изпъкнали ребра . р. *Asemum* Esch.
 — Антенитѣ сж толкова дълги, колкото е тѣлото, или сж по-дълги отъ него р. *Anisarthron* Redt.
 26. Гръдниятъ щитъ странично има по 1 бодилъ или збѣ. Тѣлото е тъмно р. *Saphanus* Serv.
 — Гръдниятъ щитъ странично нѣма бодилъ или збѣ . . 27



Фиг. 12.



Фиг. 13.



Фиг. 14.

27. Горната повърхностъ на гръдния щитъ има надлъжни вдлъбнатинки. Тѣлото е цилиндрично, закръглено. Голѣми индивиди — 18 до 25 мм. . . р. *Criocephalus* Muls.
 — Горната повърхностъ на гръдния щитъ е почти гладка, понѣкога съ слаби подутини или мозолести тѣла. Помалки индивиди 8—20 мм. 28
 28. Тѣлото е матово, сламено-жълто или по-тъмно; то е покрито съ гъсти, свѣтло-жълти, ниски космици. Вжтрѣшния ржбъ (срѣдния ржбъ) на всѣка елитра на върха си завършва съ удълженъ назадъ бодилъ. Голѣми 15—22 мм. р. *Stromatium* Serv.
 — Тѣлото цѣло или отчасти е лъскаво, жълто кафяво или сиво. Вжтрешниятъ ржбъ на елитритѣ не е удълженъ въ бодилъ. Голѣмина 8—15 мм. 20
 20. Цѣлото тѣло е лъскаво, ржждиво-жълто, гръдниятъ щитъ е слабо изпъкналъ, въ срѣдата си има една слабо вгънатата, надлъжна, гладка линия; елитритѣ сж плоски, покрити съ гъсти и ниски космици. Голѣмина 8—10 мм. р. *Alocerus* Muls.
 — Гръдниятъ щитъ е матовъ, елитритѣ сж лъскави . . . 30
 30. Тѣлото е едноцвѣтно, тъмно или по-свѣтло кафяво. То е покрито съ гъсти, петнисто разположени, сиви космици. Формата на тѣлото е цилиндрична, гръдниятъ щитъ и елитритѣ сж изпъкнали р. *Trichoferus* Wall.

— Тѣлото е тъмно кафяво, по срѣдата и на върха на елитритѣ минаватъ по-свѣтли, жълти петна. Тѣлото тукъ-тамъ е покрито съ дълги, изправени нагоре космици. Гръдниятъ щитъ и елитритѣ сж слабо изпъкнали . р. *Penichroa* Steph.

Родъ *Spondylis* F.

Sp. buprestoides L. — Единственъ европейски видъ. Тѣлото е черно, изпъкнало, по форма цилиндрично. Голѣмина 15—22 мм.

Родъ *Asemum* Esch.

As. striatum L. — Тѣлото е слабо изпъкнало, отгорѣ е матово черно, отдолу е лъскаво. Елитритѣ сж черни, покрити съ много ниски, финни космици. Всѣко крило има по 2—4 надлъжно изпъкнали ребра. Голѣмина 12—14 см. (Костенецъ баня, 5. VII. 1929. П. Др. 1 екз.)

ab. *agreste* F. — Гръдниятъ щитъ е черенъ, елитритѣ сж кафяви, антенитѣ и ходилата на краката сж по-тъмно-кафяви. Голѣмина 12—14 мм.

Родъ *Alocerus* Muls. (= *Gyamophthalmus* Kr.)

A. moesiacus Friv. (= *Callidium moesiacum* Friv.) — единственъ европейски видъ. Тѣлото е ръждиво жълто-червено, елитритѣ ситно пунктирани, покрити съ низки, жълти космици. Очитѣ доста голѣми по отношение на главата. Голѣмина 8-10 мм.

Родъ *Tetropium* Kirby.

- Въ България се срѣщатъ следнитѣ 2 вида, съ 2 вариетети:
1. Гръдниятъ щитъ е лъскавъ, отгоре ситно и финно пунктиранъ, отстрани по-гѣсто пунктиранъ и озърненъ. Тѣлото е черно, елитритѣ сж червено-кафяви, антенитѣ и краката сж червено-жълти (при типичната форма). Всѣко крило има по 2 слабо изпъкнали, надлъжни ребра. Голѣмина 10—15 мм. *castaneum* L.
 - а. елитритѣ сж тъмно-кафяви, антенитѣ и бедрата на краката сж тъмни, до черни ab. *luridum* L.
 - б. елитритѣ и антенитѣ сж черни, бедрата на краката сж червени ab. *fulcratum* Fabr.
 2. Гръдниятъ щитъ е матовъ, отгоре е много гѣсто пунктиранъ и озърненъ. Тѣлото е черно, предния и задния рѣбъ на гръдния щитъ е рѣждаво-червенъ. Антенитѣ и краката сж тъмно-кафяви, бедрата на краката тукъ-тамъ черни. Елитритѣ сж кафяви, първата $\frac{1}{4}$ отъ основата имъ сж покрити съ гѣсти, свѣтло-жълти, полегнали космици. Всѣко крило има по 2 изпъкнали, надлъжни линии. Голѣмина 10—13 мм. *fuscum* Fabr.

Родъ *Criocephalus* Muls.

Въ България се срѣщатъ следнитѣ 2 вида:

1. Повърхността на очитѣ има ситни, нѣжни космици. Третото членче на ходилата на заднитѣ крака е раздѣлено до основата си на 2 части. Срѣдниятъ ржбъ между елитритѣ на върха си е малко източень (като бодилъ). Голѣмина 18—25 *rusticus* L.
2. Повърхността на очитѣ нѣма никакви космици. Третото членче на ходилата на заднитѣ крака е раздѣлено само до половината на 2 части. Срѣдниятъ ржбъ между елитритѣ на върха е закржгленъ. Дъл. 19—25 мм. *ferus* Muls.

Родъ *Saphanus* Serv.

S. Ganglbaueri Brancs. — Тѣлото е черно, главата и грѣдния щитъ сж силно и гжсто пунктирани, антенитѣ сж покрити съ жълтеникави космици. Страничния бодилъ на грѣдния щитъ е остъръ. Голѣмина 14—15 мм.

Родъ *Cerambyx* L.

Срѣщатъ се следнитѣ 6 вида:

Таблица за определяне на видовете отъ р. *Cerambyx* L.

1. Вжтрешниятъ жгълъ при върха на елитритѣ е удълженъ назадъ въ остъръ и тънъкъ бодилъ 2
- Вжтрешниятъ жгълъ при върха на елитритѣ е заобленъ и нѣма удълженъ бодилъ 3
2. Тѣлото е тъмно-кафяво съ мазна лѣскавина, отгоре е покрито съ много нѣжни и ниски, сиви космици. Елитритѣ сж финно и плитко набръчкани, грѣдния щитъ е грубо и неправилно набръчканъ. Голѣмина 44—53 мм. *velutinus* Brulle.
- Тѣлото е черно, силно лѣскаво, елитритѣ къмъ върха сж тъмно-кафяви. Грѣдниятъ щитъ е много грубо и неправилно набразденъ, отгоре е силно блѣскавъ. Елитритѣ сж гжсто и грубо набръчкани и озърнени, къмъ върха се доста стѣсняватъ. Антенитѣ при ♂♂ индивиди сж 2 пжти по-дълги отъ тѣлото, при ♀♀ индивиди сж дълги колкото тѣлото или малко по-дълги. Голѣмина 36—54 м. *cerdo* L. (= *heros* Scop.)
3. Тѣлото е черно, елитритѣ къмъ върха сж по-свѣтло до тъмно, червено-кафяви 4
- Тѣлото е черно, елитритѣ сжщо. Грѣдниятъ щитъ отгоре има нѣколко напречни гънки. Елитритѣ напредъ сж грубо набръчкани. Голѣмина 20-30 мм. . . *Scopolii* Füssl.
4. Грѣдниятъ щитъ отгоре има плитки, правилно скулптирани

- напречни гънки. Елитритъ въ основата си сж доста плитко набръчкани и озърнени. Голѣмина 30-45 мм. *.miles* Bon.
- Гръдниятъ щитъ отгоре има дълбоки, неправилно скулптурани напречни гънки, елитритъ въ основата си сж по-грубо и дълбоко набръчкани 5
5. Тѣлото е черно, задната $\frac{1}{3}$ частъ на елитритъ е червено-кафява, ясно ограничена отъ предната. Елитритъ нѣматъ космици. Голѣмина 21—37 мм. *.nodulosus* Germ.
- Тѣлото е черно, задната частъ на елитритъ е кафява. Елитритъ сж покрити съ кжси, сиво-блѣскави космици. Елитритъ напредъ сж по-грубо набръчкани и пунктирани, назадъ сж много финно и гжсто набръчкани и пунктирани. Голѣмина 30 мм. *.dux* Fald.

Родъ *Trichoferus* Woll.

Tr. griseus Fabr. (*v. fasciculatus* Fald.) — Тѣлото е свѣтло или по-тъмно кафяво, покрито съ гжсти, сиви космици. Елитритъ сж паралелни, покрити съ множество петнисто разположени сиви, полегнали космици, между които стърчатъ и много изправени нагоре космици. Среща се по широколистнитъ дървета.

Родъ *Stromatium* Serv.

S. fulvum Vill (= *unicolor* Ol.) — Тѣлото е жълто-кафяво, покрито съ множество кжси, полегнали космици и тукъ тамъ малко изправени нагоре. Тѣлото е финно и гжсто пунктирано, елитритъ сж гжсто озърнени, всѣко крило има по 2 надлъжни гладки, слабо изпъкнали ребра. Голѣмина 14-23 мм.

Родъ *Penichroa* Steph. (= *Exilia* Muls.)

P. fasciata Steph. (= *timida* Mén.) — Тѣлото е кафяво, елитритъ къмъ върха сж по-свѣтли; една зжбоподобна напръчна ивица презъ срѣдата на елитритъ, по едно петно на върха на всѣко крило, а сжщо и рамото на елитритъ сж избѣлело жълто оцвѣтени (понѣкога тѣзи петна сж много редуцирани); главата и гръдниятъ щитъ сж ситно пунктирани, елитритъ сж по-грубо и гжсто пунктирани. Главата и щита сж матови. Голѣмина 10—12 мм.

Родъ *Gracilia* Serv.

Gracilia minuta Fabr. — Едни отъ най-малкитъ представители на семейството (4—6 мм. дължина). Тѣлото е тъмно-кафяво, матово, антенитъ и краката сж жълто-кафяви, много финно окосмени. Тѣлото е тѣсно, гръдния щитъ е по-дълъгъ, отколкото е широкъ. Антенитъ сж по-дълги отъ тѣлото; бедрата на краката сж вретеновидно разширени.

Родъ *Axinopalpis* Dür. et Chev.

Axinopalpis gracilis Кгун. — Тѣлото е тѣсно, дълго, цилиндрично, на цвѣтъ е червеникаво-жълто, блѣскаво. То е покрито съ финни, жълтеникави, полегнали, само тукъ-тамъ изправени космици. Голѣмина 11 мм..

Родъ *Obrium* Curt.

Срѣщатъ се 2 вида:

1. Тѣлото е черно, елитритѣ сж блѣдо-кафяви до жълти. Краката сж кафяви. Гръдниятъ щитъ е много слабо пунктиранъ. Голѣмина 4—5 мм. *bicolor* Кг.
2. Тѣлото е жълто-червено, елитритѣ сжщо. Краката сж кафяви или по-тъмни, съ силно подути бедра. Гръдниятъ щитъ е слабо и финно пунктиранъ, странично има малки подутинки. Голѣмина 7—8 мм. *cantharinum* L.

Родъ *Necydalis* L.

Въ България се срѣщатъ следнитѣ 2 вида:

1. Елитритѣ сж тъмно-кафяви, върха имъ е заграденъ съ черенъ ржбъ. Предния и задния ржбъ на гръдния щитъ и по-голѣмата частъ отъ елитритѣ сж покрити съ гжсти, жълти космици. Голѣмина 22—33 мм. *ulmi* Chev.
2. Елитритѣ сж жълто-кафяви, понѣкога на върха имъ има по едно тъмно петно. Предния и задния ржбъ на гръдния щитъ нѣматъ космици; елитритѣ отчасти сж покрити съ такива. Голѣмина 22—32 мм. *major* L.

Родъ *Stenopterus* Illig.

Въ България се срѣщатъ следнитѣ 2 вида:

1. Гръдниятъ щитъ отгоре има 2 гладки, изпъкнали и лъскави мѣста. Антенитѣ, краката и елитритѣ сж жълти. Основата на елитритѣ е черна. Дъл. 10—14 мм. . *flavicornis* Küst.
2. Гръдниятъ щитъ отгоре има 3 гладки, изпъкнали и лъскави мѣста. Първитѣ 2 членчета на антенитѣ, върха на последующитѣ членчета и бухалковидно надобеления връхъ на бедрата на краката сж черни. Елитритѣ сж жълти, основата и върха сж черни. Голѣмина 9—14 мм. . *rufus* L.
- a. Бедрата на заднитѣ крака въ по-голѣмата си частъ сж черни *ab. geniculatus* Kraatz.

Родъ *Molorchus* F. (= *Cynopterion* Schrk)

Въ България се срѣщатъ 2 вида:

1. 3-тото членче на антенитѣ е много по-дълго отъ I-то. Антенитѣ при ♂ индивиди иматъ 12 членчета, при ♀ инд.

- иматъ 11. Елитритъ сж кжси, жълто-кафяви, отгоре иматъ по една бѣла изпъкнала, косо разположена ивица. Антенитъ и краката (съ изключение на бухалковидно надебеленитъ върхове на бедрата) сж жълто-кафяви. Тѣлото е черно. Голѣмина 8—11 мм. *minor* L.
2. 3-тото членче на антенитъ е по-кжсо или толкова дълго, колкото е 1-то. Антенитъ и при двата пола иматъ 11 членчета. Елитритъ сж кжси. Дъл. 5.5—8 мм. . *umbellatarum* Schreb.

Родъ *Callimus* Muls.

Въ България се срѣщатъ 2 вида:

1. Краката сж сини или зелени, покрити съ дълги, бѣлезникави космици. Тѣлото е металическо синьо или зелено. II-то коремно сегментче при ♀ ♀ инд. отдолу има една напречна жълта ивица, съставена отъ гжсти, жълти космици. Голѣмина 8—9 мм. *angulatus* Schrk.
2. Краката сж черни, основата на бедрата е жълта. Тѣлото е черно, лъскаво. Коремчето е жълто. Голѣмина 7-8 мм. *Adonis* Ab.

Родъ *Deilus* Serv.

Единственъ европейски видъ *Deilus fugax* Oliv. — Тѣлото е сиво-зелено или бронзово, грубо пунктирано, покрито съ сиви космици. Scutellum'a е покритъ съ гжсти бѣли космици. Основата на антенитъ членчета, бедрата и пищялитъ сж червено-жълти. Антенитъ сж много по-кжси отъ дължината на тѣлото, гръдниятъ щитъ е по-дълъгъ, отколкото е широкъ. Голѣмина 7—10 мм.

Родъ *Aromia* Serv.

A. moschata L. — Единственъ европейски видъ. Тѣлото е зелено, виолетово или бронзово съ металенъ блѣсъкъ. Гръдниятъ щитъ отъ дветъ страни има по 1 бодилъ. Елитритъ сж гжсто и финно озърнени, отгоре иматъ по 2 надлъжни, слабо-видими, гладки ребра. Голѣмина 17—32 мм.

Родъ *Rosalia* Serv.

R. alpina L. — Единственъ европейски видъ. Тѣлото е сиво, матово, покрито съ много нѣжни блѣдо-сиви космици. Елитритъ сж сиви съ кадийано-черни петна. Антенитъ сж сиви, отъ 3-тото членче на горе върха на всѣко членче носи снопче отъ черни дълги космици. Голѣмина 22—32 мм.

Родъ *Ropalopus* Muls.

Въ България се срѣщатъ следнитѣ 4 вида:

Таблица за определяне видовете отъ родъ *Ropalopus* Muls.

1. Елитритѣ сж еднообразно черни, къмъ върха тъмно-кафяви 2
- Елитритѣ сж металическо сини или зелени, въ основата си грубо набръчкани, къмъ върха си по-нѣжно пунктирани. Тѣлото е черно, грѣдния щитъ е гладкъ, лѣскавъ, въ срѣдата сж нѣколко финни точки. Третото до десетото членче на антенитѣ на върха си отъ дветѣ страни носи по 1 бодилче. Голѣмина 18—26 мм. . . *insubricus* Germ.
2. Краката сж еднообразно черни 3
- Краката сж черни, бедрата сж червено-жълти. Тѣлото е черно, матово. Scutellum'а е покритъ съ космици. Членчетата на антенитѣ на върха си нѣматъ бодилъ. Голѣмина 10—12 мм. *femoratus* L.
3. Тѣлото е черно. Третото до 10-тото членче на антенитѣ на върха си иматъ отъ външна и вътрешна страна по 1 бодилче. Грѣдниятъ щитъ и основата на елитритѣ сж грубо набръчкани, къмъ върха сж по-финно пунктирани. Голѣмина 10—22 мм. *clavipes* F.
- Тѣлото е черно, третото до 10-тото членче на антенитѣ нѣматъ бодилъ. Грѣдниятъ щитъ и основата на елитритѣ сж покрити съ космици. Дъл. 8—12 мм. . *macropus* Germ.

Родъ *Phymatodes* Muls.

Въ България се срѣщатъ 6 вида:

Таблица за определяне видовете отъ р. *Phymatodes* Muls.

1. Грѣдниятъ щитъ е равномѣрно и гжсто пунктиранъ. Елитритѣ отгоре иматъ по една или две напречни, бѣли ивици 2
- Грѣдниятъ щитъ е по-рѣдко пунктиранъ, съ 3—5 гладки, изпъкнали, мазолести мѣста. Елитритѣ нѣматъ напрѣчни бѣли ивици 3
2. Елитритѣ сж кафяви, презъ срѣдата на всѣко крило минава по една бѣла, напрѣчна ивица, която не достига до срѣдния шевъ. Голѣмина 6—8 мм. *fasciatus* Vill.
- Първата $\frac{1}{3}$ часть на елитритѣ сж червеникаво-жълти, останалата часть е черна или кафява. Всѣко крило има по 2 изпъкнали, напрѣчни, бѣло-окоsmени ивици. Антенитѣ и краката (съ изключение бедрата) сж червеникаво-жълти. Голѣмина 4—6 мм. *alni* L.
3. Елитритѣ сж много финно, плитко и не много гжсто пун-

- ктирани. Тѣлото е рѣждаво-жѣлто, елитритѣ сѣщо, гърдичкитѣ отдолу (срѣдне и заднегърда) сѣ черни. Цвѣтътъ на елитритѣ и на гърдния щитѣ силно варира и, споредъ това, има много аберации. Голѣмина 8—15 мм.
- *testaceus* L.
- а. Елитритѣ сѣ жѣлти, върха виолетовѣ или чер. *ab. praeustus* F.
- б. Елитритѣ сѣ тъмно-сини до черни. Гърдния щитѣ, антенитѣ и краката сѣ червеникаво-жѣлти. *ab. rufipes* Costa.
- в. Тѣлото е черно или тъмно-синьо, долната страна на преднегърда, върха на коремчето, основата на бедрата, пишялитѣ и ходилата на краката сѣ червено-кафяви. *ab. fennicum* L. (= *nigrinus* Muls.).
- г. Елитритѣ сѣ жѣлти, темето на главата, антенитѣ и краката сѣ тъмни. *ab. melanocephalus* Ponza.
- д. Елитритѣ сѣ тъмно-сини, долната страна на гърдичкитѣ, темето на главата и върха на бедрата сѣ черни. *ab. variabilis* L.
- е. Елитритѣ и 3-тѣ последни членчета на коремчето сѣ жѣлти. *ab. anale* Redt.
- Елитритѣ сѣ по-дълбоко и по-гѣсто пунктирани. По-малки индивиди. Голѣмина 6—12 мм. 4
4. *Mesosternum*'а на срѣднегърда достига до срѣдата на бедренитѣ ябълки на срѣдния чифтъ крака. 5
- *Mesosternum*'а на срѣднегърда минава презъ срѣднегърда и достига чакъ до *Metasternum*'а. Тѣлото е кафяво, или черно, съ виолетовѣ отенѣкъ. Елитритѣ сѣ тъмни, рамената имъ сѣ червеникаво-жѣлти. Гърдниятъ щитѣ има 3—5 гладки, изпъкнали полета (мазолести тѣла). Коремчето често е червеникаво-жѣлто. Голѣмина 6—8 мм. *pusillus* Fabr.
5. Елитритѣ сѣ много гѣсто, равномернo и дълбоко пунктирани. Тѣ сѣ кафяви, съ виолетовѣ или синкавѣ отенѣкъ. Антенитѣ сѣ окосмени, по-свѣтло кафяви. Гърдниятъ щитѣ е дълбоко, но по-рѣдко и неравномернo пунктиранъ, съ 3 надлъжни, гладки, мазолести мѣста, отъ които 2-тѣ странични сѣ кафяви, а срѣдното е жѣлто. Долната страна на тѣлото по-свѣтло кафява, краката сѣ избѣлѣло жѣлти, отчасти кафяви. Голѣмина 7—10 мм. *lividus melancholicus* Fabr. (=R.).
- Елитритѣ не сѣ много гѣсто пунктирани, тѣлото е червеникаво-кафяво, елитритѣ сѣщо. Гърдниятъ щитѣ има освенъ срѣдната, мазолеста, гладка изпъкналостъ, странично още по 2, не много ясни такива гладки мазолести тѣла. Голѣмина 7—12 мм. *puncticollis* Muls.

Родъ *Callidium* F.

Въ България се срѣщатъ следнитѣ 2 вида:

1. Горната страна на тѣлото е металическо зелена или бронзова, долната страна и краката сж кафяви. Елитритѣ въ основата сж набръчкано пунктирани, къмъ върха сж по-грубо, мръжовидно набраздени. Дъл. 11—13 мм. *aeneum* Deg.
2. Горната страна на тѣлото е синя или виолетова, стѣпалата на краката и коремчето сж кафяви. Елитритѣ сж грубо озърнени. Голѣмина 8—15 мм. *violaceum* L.

Родъ *Pyrrhidium* Fairm.

Единственъ европейски видъ *P. sanguineum* L. — Тѣлото е плоско и широко, грѣдниятъ щитъ и елитритѣ сж покрити съ гжсти, полегнали, керемидено-червени космици; долната страна на тѣлото е черна, върха на коремчето е жълто-червенъ. Голѣмина 8—11 мм.

Родъ *Hylotrupes* Serv.

H. bajulus L. — Единственъ европейски видъ. Тѣлото е черно или тъмно до по-свѣтло кафяво, покрито съ финни, сиво-бѣли космици. Грѣдниятъ щитъ отгоре има 2 лъскави, черни, изпъкнали мѣста, елитритѣ иматъ 2 напрѣчни, зжбоподобни, бѣлезникави, не много ясни ивици. Голѣмина 8—20 мм.

Родъ *Anisarthron* Redt.

A. barbipes Schrk. — Тѣлото е тѣсно, черно, елитритѣ сж кафяви; грѣдниятъ щитъ и елитритѣ сж покрити съ гжсти, изправени нагоре жълти космици. Голѣмина 7 мм.

Родъ *Xylotrechus* Chev.

Въ България се срѣщатъ следнитѣ 3 вида:

Таблица за определяне на видовете отъ р. *Xylotrechus* Chev.

1. Елитритѣ сж черни или тъмно-кафяви, съ не много ясни бѣлезникави, напрѣчни ивици и петна. Грѣдния щитъ въ срѣдата си има 4 сиви-бѣлезникави петна отъ космици. Елитритѣ иматъ по 2—3 зигаговидни, прекъснати напрѣчни ивици, образувани отъ сиво-бѣли космици. Голѣмина 12—18 мм. *rusticus* L.
- Елитритѣ сж черни или кафяви, съ следнитѣ ясно очертани, жълти ивици или петна, образувани отъ гжсти, жълти космици на scutellum'a: по 1 малко петно отъ двѣтѣ

- му страни, по една малка ламенна, косо или напрѣчно разположена спрѣмо срѣдния шевъ ивичка, по 2 тѣсни, напрѣчни ивици презъ срѣдата на всѣко крило, отъ които I-та (джговидна) се повдига нагорѣ къмъ срѣдния шевъ и по едно на върха на крилото. 2
2. Елитритѣ сж тъмно-кафяви. Главата между очитѣ има две надлъжни, гѣсти четчици отъ жълти космици. Грѣдниятъ щитѣ има по предния и задния рѣбѣ странично 4 петна, образувани отъ гѣсти, жълти космици. Раменната малка ивичка е разположено напрѣчно на срѣдния шевъ. Голѣмина 10—17 мм. *arvicola* Ol.
- Елитритѣ сж черни. Главата между очитѣ има две слабо различни надлъжни четчици, образувани отъ рѣдки, бѣлѣзникаво-сиви космици. Раменната малка ивичка е разположено косо (наклонено) на срѣдния шевъ. Голѣмина 10—14 мм. *antilope* Schönh.

Родъ *Clytus* Laich.

Тѣлото е тъмно, елитритѣ иматъ сжщитѣ напрѣчни жълти ивици и петна, както въ предищния родъ.
Въ България се срѣщатъ три вида.

Таблица за опредѣление видоветѣ отъ р. *Clytus* Laich.

1. Антенитѣ къмъ върха сж слабо надебелени (разширени), отъ 6-то членче нагоре сж тъмно-кафяви или черни. Краката сж червено-жълти, само бедрата на предния и срѣдния чифтѣ крака къмъ върха сж по-тъмни. Раменната жълта ивичка върху елитритѣ е джговидно извита. Голѣмина 9—12 мм. *arietis* L.
- Антенитѣ къмъ върха не сж надебелени, всички членчета сж жълти. Раменната ивичка на елитритѣ е точковидна и косо разположена 2
2. Краката сж жълти, понѣкога бедрата на заднитѣ крака сж слабо затъмнени. Грѣдниятъ щитѣ е лъщивъ, той е по-грубо пунктиранъ. Голѣмина 6—10 мм. *rharni* Germ.
- Краката (съ изключение на бедрата, които сж тъмно-кафяви) сж жълти. Грѣдниятъ щитѣ е матовъ или много слабо лъщивъ, финно и гѣсто пунктиранъ. Голѣмина 8—12 мм. *lama* Muls.

Родъ *Plagionotus* Muls.

Въ България се срѣщатъ 4 вида.

Таблица за опредѣление видоветѣ отъ р. *Plagionotus* Muls.

1. Всѣко крило има близо до основата си по една напрѣчна кжса, жълта, тѣсна ивица или петно, което не е съединено съ scutellum'a 2

- Всъко крило има близо до основата си по едно напръчно, овално, жълто петно, което е непосредствено съединено съ *scutelum*'а 3
2. Антенитъ и краката сж червено-жълти, надобеленията на бедрата на предния и срѣдния чифтъ крака често сж по-тъмно кафяви или черни. Предниятъ ржбъ на грѣдния щитъ има една непрекъсната, напречна жълта ивица; задъ срѣдата на грѣдния щитъ има още една, прекъсната на две части, напречна жълта ивица. Всъко крило има следнитъ жълти петна и ивици: едно напръчно раменно петно, едно овално (полукръгло) до срѣдния шевъ, 3 напръчни, тѣсни джговидни ивици и едно петно на върха на крилото. Голѣмина 10—19 мм. (ф. 15) . . *arcuatus* L.
- Антенитъ и краката сж червено-жълти. Предния ржбъ на грѣдния щитъ има една широка напръчна жълта ивица, задъ срѣдата има още една по-тѣсна жълта ивица. Елитритъ иматъ 4 напръчни жълти ивици, отъ които I-та е много тѣсна и слабо видима, II-та е кжса и недостига до срѣдния шевъ, III-та е по-широка, достига и се разширява до срѣдния шевъ, а IV-та е много широка, достига до срѣдния шевъ, разширява се и се съединява съ върхното петно. Дъл. 14—20 мм. (ф. 16). . *detritus* L.



Фиг. 15.



Фиг. 16.



Фиг. 17.



Фиг. 18.



Фиг. 19.

3. Елитритъ иматъ следнитъ жълти петна: *scutelum*'а, едно овално, съединено съ него жълто петно, 3 напречни ивици, отъ тѣхъ I-та се повдига къмъ срѣдния шевъ, удължава се и достига близо до *scutelum*'а, II-та е джговидна, достига до срѣдния шевъ, III-тата е по-кжса, не достига до срѣдния шевъ и е слабо изпъкнала нагоре. Голѣмина 14—16 (фиг. 17) *Bobelayi* Br.
- Елитритъ иматъ сжщитъ жълти петна съ изключение: I-та напръчна ивица се повдига при срѣдния шевъ и слабо се удължава нагоре, III-та напръчна ивица е изпъкнала надолу. Върха на бедрата на краката сж по-тъмно кафяви. Голѣмина 8—14 (фиг. 18) *floralis* Pall.

Родъ *Chlorophorus* Chev.

Въ България се срѣщатъ 5 вида:

Таблица за опредѣленіе видоветъ отъ р. *Chlorophorus* Chev.

1. Горната страна на тѣлото и елитритъ сж покрити съ гжсти жълти или сиви космици, презъ нея минаватъ черни напрѣчни ивици или петна. Елитритъ на върха сж косо прерѣзани 2
- Елитритъ сж черни, съ бѣлезникави напрѣчни знаци . . . 3
2. Елитритъ сж гжсто жълто окосмени, презъ тѣхъ минаватъ две напрѣчни черни ивици, които не сж прекжснати при срѣдния шевъ; задъ рамото на всѣко крило има по единъ черенъ, ненапълно затворенъ прѣстенъ. Грѣдния щитъ е жълтъ, презъ срѣдата му напрѣчно минава една черна, по-широка, или по-тѣсна ивица. Дъл. 8-12 мм. . . . *varius* F.
- Елитритъ сж гжсто зеленикаво-жълто окосмени, презъ тѣхъ минаватъ следнитъ напрѣчни черни ивици или петна, които сж прекжснати при срѣдния шевъ: едно надлъжно петно задъ рамото, едно въ форма на буква С и по 2 на всѣко крило, напрѣчно овални. Дъл. 9—14 . . *Herbsti* Br.
3. Грѣдниятъ щитъ и елитритъ сж черни, съ бѣлезникави напрѣчни ивици и петна. Антенитъ и краката сж черни . 4
- Грѣдниятъ щитъ е червенъ, елитритъ сж черни, само 2 напрѣчни дебели ивици и върха имъ сж покрити съ белезникави космици. Антенитъ, пицялитъ и ходилата на краката сж тъмно-кафяви. Дъл. 7—10 мм. . . *trifasciatus* F.
4. Елитритъ на рамото си иматъ по едно бѣло петно или точка. Scutelum'a и около него, две напрѣчни ивици, отъ които I-та се повдига и извива нагоре къмъ scutelum'a, и върха на елитритъ сж покрити съ бѣли космици. Основата на грѣдния щитъ има една широка, но слабо различима, бѣло-окосмена напрѣчна ивица. Голѣмина 9-13 мм. *figaratus* Scop.
- Елитритъ на рамото си нѣматъ бѣла точка или петно. Тѣлото е черно. Scutelum'a, 2 тѣсни и финни напрѣчни ивици, които къмъ срѣдния шевъ се повдигатъ нагоре, и върха на елитритъ сж покрити съ гжсти бѣли космици. Голѣмина 6—9 мм. *sartor* F.

Родъ *Isotomus* Muls.

Is. speciosus Schneid. (= *semipunctatus* F.). Тѣлото е черно или по-свѣтло до тъмно-кафяво. Антенитъ и краката кафяви, бедрата на краката сж по-тъмни. Елитритъ сж тъмни, съ ярки бѣли, полулунни знаци и петна, съставени отъ гжсти космици. Грѣдниятъ щитъ е тъменъ, въ срѣдата има една надлъжна бѣла ивичка и странично отъ нея още 2 по-малки, кръгли петна или точки. Голѣмина 12—20 мм. (ф. 19, стр. 189).

ab. *Ganglbaueri* Pic.—Гръдният щитъ, и особено много елитритъ сж покрити съ гжсти, полегнали бѣли космици, които замаскирватъ останалитъ полулунни знаци и петна. (1 екз. отъ гара Левски, II. 1932 г., 1 екз. отъ с. Турия, 2. VIII. 1899 г. Йоак.).

Родъ *Anaglyptus* Muls.

An. mysticus L. Тѣлото е черно, елитритъ иматъ широка рждиво-червена основа, която странично и назадъ се простира до срѣдата на крилото. Всѣко крило има по 3 финни и тѣсни, бѣло-окосмени, джговидни, напрѣчни ивици, които къмъ срѣдния шевъ се удѣлжаватъ нагоре. Една широка ивица на върха е сжщо бѣла. Голѣмина 9—13 мм.

ab. *hieroglyphicus* Hbst. — Основата на елитритъ е черна. Другитъ белези сж сжщитъ.

Родъ *Purpuricen* Fisch.

Въ България се срѣщатъ следнитъ видове:

Таблица за определяне видовете отъ р. *Purpuricen* Fisch.

1. Гръдният щитъ е червено-жълтъ или червенъ съ 4 или 5 кадийано-черни петна, образувани отъ гжсти космици . . 2
- Гръдният щитъ е черенъ, съ или безъ червени петна, или е червенъ съ черна напрѣчна основа 3
2. Гръдният щитъ е жълто-червенъ. Отгоре му се намиратъ 2 черни, кржгли петна, до основния ржбъ има още 2 по-голѣми, косо удѣлжени, и по срѣдата има едно по-малко и почти невидимо. Елитритъ сж жълти или червеникави съ следнитъ черни ивици: основата имъ има една широка, зжбоподобна ивица, която къмъ срѣдния шевъ чрезъ тѣсенъ израстъкъ се съединява назадъ съ голѣмо сърцевидно петно, което назадъ се удѣлжава, стѣснява и после наново се разширява и дава второ сърцевидно разклонение. Върха на елитритъ е жълтъ. Голѣмина. . 18—20 мм. (фиг. 20) *dalmatinus* St.
- Гръдният щитъ е червенъ. Отгоре има 2 черни, кржгли петна (понѣкога липсватъ), до основния ржбъ има още 2 по-голѣми, съединени помежду си и по срѣдата има още едно, по-малко. Елитритъ сж червени, върха имъ ($\frac{1}{3}$ отъ елитритъ) е заетъ съ една широка, напречна, изпъкнала напредъ черна ивица. Голѣмина 18—20 мм. (фиг. 21) *Desfontaini* Fabr.
3. Върху срѣдния шевъ на елитритъ има едно елиптично черно петно, което назадъ се разширява и обхваща и върха на крилото. Гръдният щитъ е черенъ съ 2 странични

- червени петна (при типа), обаче често цвѣта му силно варира. Дъл. 13—20 мм. (фиг. 22) . . . *budensis* Götze.
- а) гръдния щитъ е черенъ, отпредъ има 2 малки червени точки *ab. punctiger* Apf.
- б) гръдния щитъ е съвършено черенъ . . . *ab. affinis* Brülle.
- в) гръдния щитъ е червенъ, само по задния рѣбъ минава една тѣсна или по-широка черна ивица . . *ab. hungaricus* Hbst.
- Върху срѣдния шевъ на елитритъ има едно елиптично, черно петно, което назадъ се стѣснява и не достига до върха на крилото 4



Фиг. 20.



Фиг. 21.



Фиг. 22.



Фиг. 23.



Фиг. 24.

4. Върха на елитритъ е слабо прерѣзанъ. Гръдния щитъ е черенъ, отстрани има 2 червени петна. Голѣмина 14—20 мм. (фиг. 23) *Kaehleri* L.
- а) гръдния щитъ е чисто черенъ *ab. nigricollis* Rag.
- Върха на елитритъ е по-силно прерѣзанъ. Тѣлото е по-тѣсно и малко. Гръдния щитъ е черенъ, отъ дветѣ страни има по едно голѣмо, полегато разположено червено петно. Дъл. 12—14 мм. (фиг. 24) *globolicollis* Muls.
- а) гръдния щитъ е черенъ, предната широка частъ и отстрани е червенъ *ab. transversalis* Müll.

Племя Lepturini.

Тукъ се числятъ 16 рода:

Таблица за опредѣление родоветъ отъ племѣ Lepturini:

1. Антенитъ сж разположени между дветѣ очи (фиг. 25,а) . 2
- Антенитъ сж разположени предъ очитѣ или сж на сжщата линия съ предната частъ на очитѣ (фиг. 25,б) 8
2. Prosternum'а на преднегърда на върха си е разширенъ (фиг. 25,а) 3
- Prosternum'а на преднегърда на върха си никакъ не е разширенъ (фиг. 26,б) 6

¹⁾ Въ материалитъ, подарени отъ г. Д. Иоакимовъ на Царската ент. станция, се намѣри 1 екз. отъ Макри (Марония) 28.VI. 1919 г., опредѣленъ като *P. desfontainei* Fabr. Този видъ не е публикуванъ досега никжде, ето защо тукъ го съобщаваме като новъ за фауната на България.

3. Очитѣ сж отдалечени отъ основата на мандибулитѣ (ф. 27,а).
 Елитритѣ къмъ върха се стѣсняватъ (при мжжкитѣ ин-
 дивиди по-силно, при женскитѣ по-слабо) 4
 — Очитѣ сж близо до основата на мандибулитѣ (защото бу-
 зитѣ сж много кжси) (фиг. 27,б). Елитритѣ сж почти пара-
 лелни, назадъ не се стѣсняватъ . . . р. *Grammoptera* Serv.
 4. Заднитѣ жгли на грѣдния щитѣ сж източени островърхо,
 или сж по-слабо удѣлжени (фиг. 28,а) 5



Фиг. 25.



Фиг. 26.



Фиг. 27.



Фиг. 28.

- Заднитѣ жгли на грѣдния щитѣ сж затжпени (фиг. 28,б) .
 р. *Leptura* L.
 5. Заднитѣ жгли на грѣдния щитѣ сж много остро източени
 и удѣлжени. Върха на елитритѣ е остро прерѣзанъ и
 външния жгълъ е често остъръ . . . р. *Strangalia* Serv.
 — Заднитѣ жгли на грѣдния щитѣ сж по-слабо удѣлжени.
 Върха на елитритѣ е слабо прерѣзанъ, или е закржгленъ
 р. *Judolia* Muls.
 6. Очитѣ отъ къмъ вжтрешна страна не сж бѣбрековидно
 изрѣзани и се намиратъ много близо до основата на
 мандибулитѣ р. *Cortodera* Muls.
 — Очитѣ отъ вжтрешна страна сж бѣбрековидно изрѣзани и
 сж разположени малко по-далечъ отъ основата на ман-
 дибулитѣ 7
 7. Грѣдния щитѣ е конически, заднитѣ жгли сж островърхо
 удѣлжени р. *Alosterna* Muls.
 — Грѣдния щитѣ не е конически, странично е топчесто раз-
 ширенъ, заднитѣ му жгли сж закржглени . р. *Pidonia* Muls.
 8. Пищялитѣ на заднитѣ крака на върха си нѣматъ дълбока
 изрѣзка (фиг. 29,а) 9
 — Пищялитѣ на заднитѣ крака на върха си отъ вжтрешна
 страна иматъ изрѣзка, въ началото на която се нами-
 ратъ два бодли (фиг. 29,б) р. *Stenocorus* Bat.
 9. Третото членче на стжпалата на заднитѣ крака е раздво-
 ено до срѣдата на дължината си. Отъ дветѣ страни на
 грѣдния щитѣ се намира по 1 бодловиденъ израстъкъ .
 р. *Pachyta* Zett.
 — Третото членче на стжпалата на заднитѣ крака е раздво-
 ено до основата си на две части 10
 10. Страничните ржбове на грѣдния щитѣ въ срѣдата си
 иматъ по едно гърбаво (бодловидно) възвишение (фиг.
 30,а) 11

- Страничните ржбове на гръдния щитъ сж закржглени, безъ възвишения (фиг. 30,б). Mesosternum'а на срѣдне-гърда отдолу е остъръ, тѣсенъ и трижгленъ р. *Asmaeops* Lec.
- Страничните ржбове на гръдния щитъ въ срѣдата си иматъ по единъ остъръ или по-тѣпъ бодилъ (фиг. 30,в) . . . 12



Фиг. 29.



Фиг. 30.

Фиг. 31.

11. Елитритъ сж сини или зелени съ металенъ блѣсъкъ. Гръд-ниятъ щитъ е червенъ или черенъ . . . р. *Gaurotres* Lec.
- Елитритъ сж матово жълти, съ черни точки или петна, или пѣкъ елитритъ сж черни съ жълти петна р. *Evodinus* Lec.
12. Prosternum'а на преднегърда (между основата на пред-нитъ крака) е широкъ и силно изпъкналъ. Страничните ржбове на гръдния щитъ иматъ по единъ остъръ бо-дилъ (фиг. 30,в) р. *Rhagium* F.
- Prosternum'а на преднегърда е тѣсенъ и разположенъ дълбоко между изпъкналитъ бедрени ябълки на краката 13
13. Главата между очитъ е изпъкнала, слѣпоочнитъ области задъ очитъ сж ясно оразличени и удължени, главата на-задъ изведнажъ се стѣснява. Елитритъ назадъ сж почти паралелни (фиг. 31,а) 14
- Главата между очитъ не е подута. Слѣпоочнитъ области задъ очитъ сж кжси и главата назадъ постепенно се стѣснява (фиг. 31,б). Елитритъ назадъ се стѣсняватъ, при мжжкитъ индивиди по-силно, при женскитъ по-слабо р. *Tocotus* Zett.
14. Главата между очитъ е силно подута. Очитъ сж финно фацетирани. Гръдниятъ щитъ е лѣскавъ, гладкъ, ели-ритъ сж сини р. *Rhamnusium* Latr.
- Главата между очитъ не е много изпъкнала. Очитъ сж грубо фацетирани. Гръдниятъ щитъ е гжсто и ситно пунктиранъ. Елитритъ сж тъмно или по-свѣтло кафяви, съ жълтеникави петна р. *Xylosteus* Friv.

Родъ *Rhagium* F.

Въ България се срѣщатъ 4 вида:

Таблица за определяне видовете от р. *Rhagium* F.:

1. Задочните (temporal'ните) области на главата сж удължени и задъ тѣхъ главата изведнажъ силно се стѣснява . . . 2
- Задочните (temporal'ните) области на главата сж кжси и задъ тѣхъ главата постепенно и слабо се стѣснява. Елитритѣ сж сиво-жълти, покрити съ сиви, петнисто-разположени космици. Всѣко крило има по 3 надлъжни, изпъкнали ребра, отъ които дветѣ външни къмъ върха на крилото се съединяватъ въ едно. Надлъжните ребра, прекжснати тукъ-тамъ, 2 напрѣчни ивици и нѣколко други по-малки мѣста на елитритѣ сж черни и безъ космици (голи). Голѣмина 13—18 мм. *inquisitor* L.
2. Горната страна на тѣлото е покрита съ гжсти, петнисто разположени групички отъ жълти или сиви космици. Всѣко крило има по две жълти или жълто-червени напрѣчни ивици, покрити и маскирани отъ множество жълтеникави космици. Антенитѣ и краката сж гжсто окосмени 3
- Горната страна на тѣлото е оскждно покрита съ финни, равномерно разположени, ниски, сиви, космици. Scutelum'a е покритъ съ гжсти, жълтеникави космици. Елитритѣ сж черни, лѣскави, странитѣ и върха имъ сж червеникаво-кафяви. Всѣко крило има по 2 полегати, напрѣчни, блѣдо-жълти ивици. Антенитѣ, съ изключение на основното членче, основата на бедрата, пицятитѣ (безъ върха си) и стѣпалата на краката сж червено-кафяви. Останалитѣ части сж по-тъмни до черни. Дъл. 15—21 мм. *bifasciatus* F.
3. Елитритѣ иматъ по едно възвишение между рамото и scutelum'a. Между дветѣ напрѣчни жълто-червени ивици на елитритѣ нѣма голо (безъ космици), черно поле. Голѣмина 18—25 мм. *sycophanta* Schrk.
- Елитритѣ нѣматъ възвишение между рамото и scutelum'a. Между дветѣ напрѣчни жълтеникави ивици на елитритѣ има по-едно голѣмо, черно, лишено отъ космици петно. Голѣмина 15—20 мм. *mordax* Deg.

Родъ *Rhamnusium* Latr.

Въ България се срѣща вида *Rh. bicolor* Schr. Главата, гръдния щитъ, коремчето, краката и основнитѣ 4 членчета на антенитѣ сж кафяви, елитритѣ и останалитѣ части сж тъмно-сини, съ металенъ блѣсъкъ. Гръдниятъ щитъ е гладкъ, лѣскавъ, въ срѣдата има две изпъкнали възвишения. Голѣмина 17—22 мм.

Родъ *Xylosteus* Friv.

Въ България се намѣриха 2 вида: Тѣй като типичнитѣ форми на видовете не сме срѣщали, ще дадемъ кратко описание на аберацитѣ:

1. *Xylosteus spinole* Friv. ab. *bulgaricus*¹ Heyr.—Горната страна на тѣлото е по-тъмнокафява, долната страна — по-свѣтла. Елитритѣ сж гжсто и едро пунктирани. Всѣко крило има по 3 сламено-жълти петна, отъ които едно се намира предъ върха на крилото и две косо разположени до страничния ржбъ. (Раменното петно, което се срѣща при типичната форма, тукъ липсва).

2. *Xylosteus Bartoni* ab. *Heyrovsky* Ob. — Тѣлото е тъмно-червеникаво-кафяво. Елитритѣ сж гжсто и едро пунктирани. Всѣко крило има по 2 жълтеникави петна, разположени до страничния ржбъ.

Родъ *Toxotus* Zett. (= *Oxymirus* Muls.)

Въ България се срѣща вида *cursor* L. — Мжжкитѣ индивиди сж черни, тѣлото имъ е тѣсно, покрито съ сребристи, мазно-лъскави космици, женскитѣ индивиди сж по-широки, тѣлото е ржждиво-кафяво. Всѣко крило има по две надлъжни, широки, черни ивици, едната минава по срѣдния шевъ, а другата започва отъ рамото и свършва малко предъ върха на крилото. Голѣмина 16—23 мм.

Родъ *Stenocorus* Bat. (= *Toxotus* Bat.)

St. quercus Götze. — Третото членче на антенитѣ е по-кжсо отъ петото. Тѣлото е черно. При мжжкитѣ индивиди коремчето и рамената на елитритѣ сж червени, а при женскитѣ индивиди елитритѣ сж кафяво-жълти или черни. Голѣмина 13—19 мм.

Родъ *Pachyta* Zett.

Въ България се срѣщатъ следнитѣ 2 вида:

1. Тѣлото е черно, елитритѣ сж нечисто кафяви или жълтеникави; всѣко крило има по 2 неясно ограничени и блѣди, напрѣчни, черни петна, отъ които горното се удължава навънъ, достига и обхваща рамото. Голѣмина 16—20 мм. *lamea* L.
2. Тѣлото е черно, елитритѣ сж чисто жълти или свѣтлокафяви; всѣко крило има по 2 черни, ясно оформени петна, отъ които горното е закржлено, навънъ не се удължава и не обхваща рамото. Голѣмина 14—24 мм. *quadrимaculata* L.

¹ Оригиналната диагноза на тази аберация е публикувана въ статията на D-г L. Heyrovsky: „Beitrag zur Kenntnis der bulgarischen Cerambyciden“, въ „Известия на Царскитѣ Научни Институти“. Кн. IV, 1931 год., стр. 84. София.

Родъ *Evodinus* Lec. (= *Brachyta* Fairm.)

Срещатъ се 2 вида.

1. Първото (основното) членче на стъпалата на задните крака е толкова дълго, колкото последующите две заедно или е малко по-дълго. Тълото е черно. Първите 4 членчета и основата на V-тото членче на антените, пицхалитъ на краката (съ изключение на върха имъ) и елитритъ сж сламено-жълти. Останалитъ части сж черни. Всѣко крило има по 6 кръгли, черни точки, отъ които 3 близо до срѣдния шевъ и 3 — близо до страничния рѣбъ. Голѣмина 14—15 мм. *balcanicus* Hamp.
2. Първото (основното) членче на стъпалата на задните крака е тѣсно и е доста по-дълго отъ дветъ последующи заедно. Тълото е черно. Антенните членчета отъ третото нагоре въ основата си сж жълто-кафяви. Краката сж червени или жълти (съ изключение върха на бедрата и пицхалитъ, които сж черни). Елитритъ сж неравни, съ вдлъбнатини и бразди. Елитритъ сж черни, съ две напрѣчни, разкжсани жълти ивици и множество други малки мрежовидни, жълти петна, или — елитритъ сж кафяви, върха, странитъ, една напрѣчна ивица по срѣдата, нѣколко чертички на предната половина и нѣколко въ задната сж черни. Голѣмина 10—12 мм. . . *clathratus* Fabr.

Родъ *Asmaeops* Lec.

Въ България се срещатъ 3 вида.

Таблица за определяне видовете отъ рода *Asmaeops* Lec.:

1. Гръдниятъ щитъ е изпъкналъ чакъ до предния рѣбъ. По срѣдата на гръдния щитъ нѣма надлъжна бразда. Тълото е черно, елитритъ сж синьо-черни, гръдниятъ щитъ е червенъ, коремчето жълто-червено. Горната поврхностъ е покрита съ финни, изправени нагоре тъмни космици. Голѣмина 7—9 мм. *collaris* L.
- Гръдниятъ щитъ е прищѣпнатъ до предния си рѣбъ, въ срѣдата има надлъжна бразда (линия) 2
2. Очитъ сж отдалечени отъ основата на мандибулитъ. Първото (основното) членче на стъпалата на задните крака е доста по-дълго отъ дветъ последующи заедно. Елитритъ сж жълто-кафяви. Едно раменно удължено петно, върха и срѣдния шевъ на елитритъ сж черни. Голѣмина 7—11 мм. *pratensis* Laich.
- Очитъ сж много близо до основата на мандибулитъ. Първото (основното) членче на стъпалата на задните крака е малко по-дълго отъ дветъ последующи. Елитритъ сж черни или странично иматъ жълтеникавъ рѣбъ (рѣдко цѣлитъ елитри сж жълти). Дъл. 8-9 мм. *septentrionis* Thoms.

Родъ *Gaurotos* Lec.

Въ България се срѣща вида *G. virginea* L. — Тѣлото е черно, безъ космици. Гръдниятъ щитъ е кафяво-червенъ (при *ab. thalassina* Schrk.) и черенъ или тъмно-кафявъ (при типичната форма). Коремчето е черно-кафяво, елитритъ сж сини, зелени до виолетови, съ силенъ металенъ блѣсъкъ. Елитритъ сж грубо скулптирани. Голѣмина 9—12 мм.

Родъ *Cortodera* Muls.

Въ България се срѣщатъ 3 вида.

Таблица за опредѣление на видоветъ отъ р. *Cortodera* Muls.:

1. Последното членче на челюстнитъ пипалца на върха си не е разширено, а е закрѣглено или прерѣзано. Коремчето е съвсемъ черно 2
- Последното членче на челюстнитъ пипалца на върха е разширено и е косо отрѣзано. Коремчето е черно, понѣкога върха му е червенъ или жълтъ 3
2. Гръдниятъ щитъ въ срѣдата е вдлъбнатъ, но нѣма гладка неокосмена линия. Тѣлото е черно, елитритъ иматъ зеленикавъ оттенъкъ. Основитъ на антенитъ и на бедрата на краката сж червено-кафяви. Елитритъ сж черни, всѣко крило въ основата си има по 2 жълто-кафяви петна. Главата, гръдниятъ щитъ и долната страна на тѣлото сж покрити съ много гжсти, полегнали, жълтеникаво-сиви космици. Елитритъ сж гжсто пунктирани и покрити съ по-рѣдки, зеленикаво-сиви космици. Голѣмина 11 мм. *humeralis* Schall.
- Гръдниятъ щитъ въ срѣдата си надлъжно е вдлъбнатъ и има една гладка, неокосмена линия. Тѣлото е черно. Елитритъ иматъ зеленикавъ оттенъкъ, основата на антенитъ и по-голѣмата частъ отъ краката сж червено-жълти. Елитритъ много финно пунктирани. Голѣмина 11 мм. *femorata* F.
3. Главата, гръдниятъ щитъ и коремчето (съ изключение на последнитъ членчета) сж черни. Краката сж черни, предния чифтъ, съ изключение на ходилата и основата на бедрата сж жълти. Елитритъ сж жълто-кафяви, страничнитъ имъ рѣбове и срѣдния шевъ сж черни. Елитритъ сж ситно и финно пунктирани. Голѣмина 7—11 мм. *flavimana* Waltl.
- a: елитритъ сж тъмни до черни *ab. brachialis* Glb.

Родъ *Pidonia* Muls.

Единственъ европейски видъ — *P. lurida* Fabr. — Главата и гръдниятъ щитъ сж тъмно-кафяви и финно пункти-

рани, елитритът сж сламено-жълти или блѣдо-кафяви. Антенитът сж тъмно-кафяви, първитът две членчета и върха на всички останали сж свѣтло-кафяви, първиятъ чифтъ крака сж жълто-кафяви, върха на бедрата и пищялитът на втория и третия чифтъ крака сж черни. Голѣмина 9—11 мм.

ab. *Ganglbaueri* Ormay. — Главата и грѣдниятъ щитъ сж черни. Страничните рѣбове и срѣдния шевъ на елитритът сж тъмни до черни. Тѣлото отдолу е черно.

Родъ *Grammoptera* Serv.

Въ България се срѣщатъ 3 вида.

Таблица за определяне видовете отъ р. *Grammoptera*:

1. Краката сж жълти, само стѣпалата сж черни. Антенитът сж кафяви, първото (основното) членче е по-свѣтло. Тѣлото е черно, горната страна е покрита съ златно-жълти, лъщиви космици. Главата и върха на елитритът сж безъ космици. Голѣмина 6—7 мм. *ustulata* Schall.
— Краката отчасти или цѣлитът сж черни 2
2. Антенитът сж тъмно-кафяви, първитът две членчета и основата на всѣко последуеще сж свѣтло-кафяви, краката сж черни, основата на бедрата, понѣкога и пищялитът сж жълти. Грѣдниятъ щитъ и елитритът сж обрасли съ сиви или жълтеникави, лъщиви космици. Голѣмина 4—6 мм. *ruficornis* F.
— Антенитът сж черни, само къмъ върха сж тъмно-червеникави. Тѣлото е черно. Грѣдниятъ щитъ и елитритът сж покрити съ финни, сиви космици, безъ блѣсъкъ. При ♂♂ индивиди последнитѣ 2—3 коремни сегменти и основата на бедрата на краката сж червено-жълти. Дълж. 6—9 мм. *variegata* Germ.

Родъ *Alosterna* Muls.

Alosterna tabacicolor Deg. — тѣлото е малко, черно. Елитритът, краката и основата на антенитът сж кафяво-жълти. Елитритът по срѣдния си шевъ, страничния рѣбъ и върха сж малко по-тъмни или черни. Голѣмина 6—8 мм.

Родъ *Leptura* L.

Въ България се срѣщатъ следнитѣ 17 вида.

Таблица за определяне видовете отъ р. *Leptura* L.:

1. Елитритът назадъ се стѣсняватъ слабо (при ♀ инд.), или по-силно (при ♂ инд.) 3
— Елитритът назадъ не се стѣсняватъ, страничните имъ рѣбове сж паралелни 2

2. Елитритѣ сж еднообразно черни. Тѣлото е черно. Краката (съ изключение на ходилата) сж червено-жълти. Гръдниятъ щитѣ и елитритѣ сж дълбоко и грубо пунктирани и сж лъскави. Върха на елитритѣ е закръгленъ. Голѣмина 9—11 мм. *rufipes* Schall.
- Елитритѣ сж черни, всѣко крило има по 3 червено-жълти петна, наредени едно подъ друго. Главата, гръдниятъ щитѣ и елитритѣ сж гжсто пунктирани. Върха на елитритѣ е прерѣзанъ косо. Вншниятъ жгълъ е тжпъ. Голѣмина 9—10 мм. *sexquittata* F.
3. Горната страна на гръдния щитѣ е покрита съ кжси, полегнали назадъ космици 4
- Горната страна на гръдния щитѣ е покрита съ по-дълги, изправени нагоре космици 6
4. Върхътъ на елитритѣ е отрѣзанъ полегато, вншниятъ му жгълъ е тжпъ или правъ. Тѣлото е черно. Елитритѣ сж червени. Върхътъ на елитритѣ и едно сърцевидно петно върху срѣдния шевъ, съединено съ върха — сж черни. Голѣмина 12—16 мм. *cordigera* Füssly.
- Върхътъ на елитритѣ е отрѣзанъ косо, вншниятъ жгълъ е остъръ 5
5. Елитритѣ сж жълто-кафяви (при мжжкитѣ индивиди) или червено-кафяви (при женскитѣ). Тѣлото е черно, гръдниятъ щитѣ е черенъ (при мжж. инд.) или червенъ (при женс. инд.). Главата и гръдния щитѣ сж гжсто пунктирани, матови. Краката сж жълто-кафяви, съ изключение на бедрата, които сж черни. Голѣмина 11—19 мм. *rubra* L.
- a. главата задъ очитѣ има две червени петна ab. *maculiceps* Fabr.
- Елитритѣ сж черни и при двата пола. Тѣлото е черно, матово, покрито съ много финни, жълти космици. Scutellum'a при мжж. инд. е покритъ съ сребристо-бѣли космици, при женск. инд. е покритъ съ злато-жълти космици. Голѣмина 14—21 мм. *scutellata* F.
6. Елитритѣ на върха сж косо отрѣзани, вншниятъ жгълъ е остъръ 7
- Елитритѣ на върха сж тжпо отрѣзани, вншниятъ жгълъ е тжпъ или правъ 10
- Елитритѣ на върха сж закръглени или прерѣзани, но жглитѣ сж закръглени 13
7. Краката сж еднообразно червени, понѣкога отчасти сж черни. Антенитѣ сж тъмно-червено-кафяви или черни 8
- Краката сж черни, понѣкога пиццалитѣ на I-ия чифтѣ крака сж кафяви. Антенитѣ сж съвсемъ черни 9
8. Краката отчасти сж червени, отчасти черни. Първиятъ и вториятъ чифтѣ крака (съ изключение основата на бедрата) сж червени; третия чифтѣ крака, съ изключение върха на пиццалитѣ, сж черни. Елитритѣ сж червено-ка-

фяви. Антенитъ при мжж. индивиди сж тъмно-кафяви, съ изключение на основнитъ 3 членчета, които сж черни. Главата и гръдниятъ щитъ сж черни. Голѣмина 14—17 мм.

- *erythroptera* Hag.
- Цѣлитъ крака и елитри сж жълто-червени. Антенитъ и при двата пола сж черни. Тѣлото е черно, коремчето е кафяво, при ♀ инд. основата му е черна. Голѣмина 14 мм. *rufa* Br.
9. Елитритъ при ♂ и ♀ инд. сж жълто-кафяви съ черенъ връхъ. Последното коремно членче при ♂♂ инд. е силно изрѣзано навътре и кухо, при ♀♀ инд. има по срѣдата си една надлъжна, плитка бразда. Голѣмина 10—12 мм. *fulva* Deg.
- Елитритъ при ♀♀ инд. сж еднообразно, матово-червени, а при ♂♂ инд. сж жълто-кафяво, съ черенъ връхъ. Външниятъ рѣбъ на елитритъ е сжщо черенъ. Голѣмина 9—11 мм. *sanquinolenta* L.
- Елитритъ при ♀♀ инд. сж червено-кафяви, покрити съ жълти, лѣскави космици, страничниятъ рѣбове и върха имъ сж черни; елитритъ при ♂♂ инд. сж жълто-кафяви, една сравнително широка странична ивица по външния рѣбъ, върха, а понѣкога и срѣдния шевъ сж черни. Голѣмина 9—14 мм. (Цвѣта на елитритъ силно варира—отъ червенъ, кафявъ до чисто черенъ, или съ слаби червени петна) *dubia* Scop.
- а. Тѣлото е черно, елитритъ сжщо черни .ab. *chamomillae* F.
- б. Елитритъ сж черни, рамената и върха имъ сж червени ab. *Starki* Schils.
10. Основитъ на срѣднитъ членчета на антенитъ сж бѣлезниково-жълти, върховетъ имъ сж черни, останалитъ членчета на антенитъ сж черни 11
- Всичкитъ членчета на антенитъ сж черни 12
11. Елитритъ сж черни, покрити съ жълто-зелени или сиви, лѣскави, кжси и много гжсти космици. Гръдниятъ щитъ и особено коремчето сж покрити съ сжщитъ космици. Голѣмина 15—19 мм. *virens* L.
- Елитритъ сж жълто-кафяви, понѣкога върха и външния имъ рѣбъ сж по-тъмни. Дъл. $8\frac{1}{2}$ —10 мм. *maculicornis* Deg.
12. Тѣлото е черно, елитритъ сж жълто-кафяви, върха имъ и въ срѣдата на всѣко крило по една точка, сж черни. Главата е ситно пунктирана, гръдния щитъ и елитритъ сж по-грубо пунктирани. Голѣмина 13-16 мм. *tesserula* Charp.
- Тѣлото е черно, елитритъ сж еднообразно червено-кафяви. Главата и гр. щитъ сж по-ситно и гжсто пунктирани. Голѣмина 10—12 мм. *pallens* Br.
13. Елитритъ сж еднообразно жълти. Гръдниятъ щитъ е покритъ съ жълтеникави, гжсти космици. Тѣлото е черно, краката сжщо, съ изключение на пищялитъ на предния и срѣдния чифтъ крака, които сж жълтеникави. Голѣмина $6\frac{1}{2}$ —8 мм. *livida* Fabr.

- Елитритѣ сж червено-кафяви или червено-жълти, всѣко крило има по една черна, кржгла точка, понѣкога и върха е черенъ 14
14. Главата, грѣдниятъ щитъ и елитритѣ сж покрити съ гжсти бѣлезникави или жълтеникави космици. Елитритѣ сж жълто-кафяви, по срѣдата на всѣко крило има по 1 черно петно, срѣдниятъ шевъ на елитритѣ е сжщо черенъ. Голѣмина 8—11 мм. *unipunctata* F.
- Главата и грѣдниятъ щитъ сж покрити съ по-тъмни, понѣкога черни, изправени нагоре космици. Елитритѣ сж покрити съ по-низки и рѣдки, жълтеникави космици. Елитритѣ сж сламено-жълти или кафяво-жълти, върха имъ, срѣдниятъ шевъ и по една точка на всѣко крило — сж черни. Голѣмина 11—14 мм. *moesiaca* Dan.

Родъ *Iudolia* Muls.

Въ България се срѣщатъ два вида.

Тѣ се отличаватъ помежду си по следнитѣ белѣзи:

1. Елитритѣ сж жълто-кафяви, слабо лъскави, много финно-пунктирани, срѣдниятъ шевъ е черенъ. Основниятъ ржбъ на елитритѣ, 2 напрѣчни назжбени ивици, отъ които горната често е прекжсната, и върха на елитритѣ сж черни. Голѣмина 8—12 мм. *erratica* Dalm.
- а. коремчето е тъмно-червено, врѣхното петно на елитритѣ, понѣкога и другитѣ напрѣчни ивици, червено-черни. *ab. erythrura* Küst.
2. Елитритѣ сж жълто-кафяви, матови, по-грубо и гжсто-пунктирани. Върхътъ на елитритѣ, две напрѣчни ивици, (прекжснати до срѣдния шевъ, отъ които пѣрвата е винаги разкжсана на 2—3 петна) сж черни. Чернитѣ петна много вариратъ. Голѣмина 8—12 мм. *cerambyciformis* Schr.

Родъ *Strangalia* Serv.

Въ България се срѣщатъ 10 вида.

Таблица за опредѣление видоветѣ отъ р. *Strangalia*:

1. Елитритѣ сж черни съ жълти напрѣчни ивици 2
- Елитритѣ нѣматъ такива напрѣчни ивици 5
2. Тѣлото е много тѣсно. Последнитѣ 6 членчета на антенитѣ странично и къмъ върха си иматъ много нѣжно оформени, надлъжни вдлъбнатинки. Тѣлото е черно, краката (съ изключение върха на бедрата и ходилата на заднитѣ крака), срѣднитѣ членчета на коремчето (при ♂♂) и 4 напрѣчни, прекжснати при срѣдния ржбъ ивици върху елитритѣ, сж жълти. Пѣрвитѣ 5 членчета на антенитѣ сж черни, останалитѣ сж жълто-кафяви (понѣкога цѣлитѣ сж жълто-кафяви). Грѣдниятъ щитъ е покритъ съ

- жълтеникави, лъскави космици, долната страна на тѣлото сѣщо. Голѣмина 12—15 мм. *attenuata* L
- Тѣлото е по-широко. Последнитѣ 6 членчета на антенитѣ нѣматъ вдълбнатини 3
3. Дветѣ страни на грѣдния щитъ иматъ по единъ малѣкъ, но ясно видимъ тѣплъ бодилъ. Грѣдниятъ щитъ е подѣлѣнъ, отколкото широко. Тѣлото е черно, покрито съ финни космици. Елитритѣ сѣ жѣлти, сѣ изключение на срѣдния шевъ, върха, една напрѣчна ивица предъ върха и въ първата половина на елитритѣ 7 петна — сѣ черни. (Петната по голѣмина и форма вариратъ твърде много). Краката сѣ жѣлти, сѣ изключение върха на бедрата, пищялитѣ и стѣпалата на заднитѣ крака, които сѣ черни. Антенитѣ сѣ жѣлти, сѣ изключение на първото членче и основитѣ на всички последующи — които сѣ черни. Голѣмина 13—18 мм. *maculata* Rod
- а) Дветѣ по-голѣми черни петна въ първата половина на елитритѣ липсватъ, оставатъ две малки, слабо различни черни точки близо до срѣдния шевъ и странично отъ тѣхъ, върху странични рѣбъ по 2, едно надъ друго по-голѣми черни петна *ab. binotata* Muls.
- б) Въ първата половина на елитритѣ липсватъ четири черни петна, оставатъ странично по едно малко и подъ него едно по-голѣмо петно *ab. externepunctata* Muls.
- Странитѣ на грѣдния щитъ нѣматъ бодилъ. Грѣдниятъ щитъ е по-широкъ отколкото дѣлѣнъ или е почти толкова широко, колкото дѣлѣнъ 4
4. Предниятъ и задниятъ рѣбъ на грѣдния щитъ сѣ покрити съ гѣсти, дѣлги златно-жѣлти, лъскави космици. Тѣлото е черно. Всѣко крило има по 4 жѣлти, напрѣчни ивици, които сѣ прекѣснати до черния срѣденъ шевъ. Коремнитѣ сегменти сѣ покрити по напрѣчнитѣ си рѣбове съ златно-жѣлти космици. Антенитѣ при мѣжкитѣ индивиди сѣ черни, при женскитѣ индивиди сѣ червено-жѣлти. Голѣмина 15—18 мм. *aurulenta* F.
- Цѣлата повърхностъ на грѣдния щитъ е покрита съ сиви или жълтеникави космици. Тѣлото е черно, елитритѣ сѣ сѣщо черни, всѣко крило има по 4 напрѣчни жѣлти ивици, прекѣснати до срѣдния шевъ. Долната страна на тѣлото е покрита съ жѣлти, лъскави космици. Голѣмина 12—16 мм. *quadrifasciata* L.
5. Коремчето е черно 6
- Коремчето цѣло или отчасти е червено или жѣлто 7
6. Грѣдниятъ щитъ въ радния си рѣбъ е разширенъ и е малко по-тѣсенъ отъ основата на елитритѣ. Тѣлото е черно, покрито съ финни, жѣлтозеленикави космици, долната страна е по-гѣсто окосмена. Елитритѣ и основата на пищялитѣ на краката при женскитѣ индивиди сѣ жѣлто-кафяви, при мѣжкитѣ индивиди сѣ сѣвършено черни. Голѣмина 12—15 мм. *pubescens* F.

- Задниятъ ржбъ на гръдния щитъ е по-тъсенъ отъ основата на елитритъ. Гръдниятъ щитъ е доста грубо и гжсто пунктиранъ, почти е безъ блѣсъкъ. Тѣлото е черно. Елитритъ при женскитъ индивиди сж кафяво-червени, една широка, клиновидна ивица по срѣдния шевъ, съединена съ върха на елитритъ, страничния ржбъ и върха, сж черни. Елитритъ при мъжкитъ индивиди сж кафяви, върха и една тѣсна ивица по срѣдния шевъ, сж черни. Голѣмина 7—11 мм. *melanura* L.
7. Краката сж черни. Главата и гръдниятъ щитъ сж сжщо черни 8
- Краката сж жълто-кафяви, съ изключение бедрата и върха на пищялитъ на задния чифтъ крака, които сж черни. Главата и гръдниятъ щитъ сж черни. Едно петно на темето на главата и едно къмъ задния ржбъ на гръдния щитъ сж червено-кафяви. Елитритъ сж ржждиво-кафяви, върха имъ, една напречна ивица предъ върха, едно общо за дветъ крила петно, разположено върху срѣдния шевъ задъ scutellum'a и въ срѣдата на всѣко крило по едно кръгло петно, сж черни. (Петната много вариратъ и затова има много аберации). Коремчето, съ изключение на върха, е червено. Дъл. 8—10 мм. *septempunctata* Fabr.
- а) Гръдниятъ щитъ е червено-кафявъ. Чернитъ петна върху елитритъ сж запазени, както при типичната форма *ab. latenigra* Pic.
- б) Гръдниятъ щитъ е червено-кафявъ, елитритъ по-свѣтло кафяви. Чернитъ петна на елитритъ сж редуцирани, отъ тѣхъ сж запазени само две малки черни, слаби точки, въ срѣдата и близо до срѣдния шевъ *ab. pallidicolor* Pic.
- в) Гръдниятъ щитъ е червено-кафявъ, въ срѣдата има едно неясно черно петно. Чернитъ петна на елитритъ както при типичната форма *ab. notaticollis* Pic.
8. Тѣлото и елитритъ сж черни 9
- Тѣлото е черно, елитритъ сж червено-кафяви. Срѣднитъ 3 коремни членчета сж червени. При мъжкитъ индивиди върха на елитритъ и срѣдния шевъ сж слабо затъмнени или черни, при женскитъ индивиди — последната четвъртъ на елитритъ и една напречна ивица задъ срѣдата на крилото, разширена къмъ срѣдния шевъ и свързана съ върхното петно, сж черни. Дъл. 7—10 мм. *bitasciata* Müll.
-) Елитритъ нѣматъ никакви черни петна *ab. immaculata* Pic.
9. Главата е черна, безъ петна. Коремчето при женскитъ индивиди е червено, само върхното сегментче е черно, при мъжкитъ индивиди коремчето въ основата е черно, последнитъ 3 сегменти сж червени. Дъл. 7—9 мм. *nigra* L.
- Главата е черна, темето задъ очитъ има едно напречно тъмно-червено петно, често раздѣлено на две. Коремчето е червено, само върха е черенъ. Дъл. 11—12 мм. *verticalis* Germ.